

Investigating the Gender Effect on the ADHD Symptoms Based on the Evaluation of Gray Matter Density Changes

Mozhdeh Haddadpour¹, Mahdi Saadatmand^{2*}, Fabrice Wallois³

¹PhD Student, Biomedical Engineering (Faculty of Engineering), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

^{2*}Associate Professor, Ferdowsi Cognitive Science and Technology Center & Medical Imaging Lab, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

³INSERM, U1105, GRAMFC, Université de Picardie, CHU Nord, Amiens F80000, France

E-mails: mozhdeh.haddadpour@mail.um.ac.ir; saadatmand@um.ac.ir; fabrice.wallois@u-picardie.fr

Abstract

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most prevalent childhood disorders, mainly characterized by inattention, hyperactivity, and impulsivity. These symptoms often manifest differently in males and females. This study investigates the relationship between ADHD and gray matter (GM) density in the brain, with a focus on gender differences. Structural MRI data were obtained from the ADHD-200 database, including 164 male controls, 227 male ADHDs, 129 female controls, and 67 female ADHDs, all aged between 7 and 14 years. Voxel-based morphometry (VBM) analysis was used to compare GM density between ADHD and control groups for each gender. The findings indicate significant GM alterations in specific brain regions: the posterior cingulate gyrus, precuneus, hippocampus, and thalamus in males, and the cerebellum in females. These regions play key roles in cognitive functions such as learning, memory, emotion regulation, and visual processing. As a result, male ADHD patients may experience difficulties in managing these functions, while female patients may particularly struggle with attention compared to their healthy peers. This gender-specific pattern highlights the importance of considering sex differences in the neurobiological basis of ADHD.

Keywords

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Voxel-based morphometry (VBM), Gender differences, Gray matter density, Structural MRI, Neurodevelopmental Disorders.

1- Short Paper (4-5 lines)

This section provides an overview of the foundation of ADHD, including its symptoms, the influence of genetic and environmental factors, diagnostic methods, and the utilization of neuroimaging techniques such as VBM method to assess the gray matter density changes due to ADHD. It also highlights disparities in ADHD prevalence and symptom presentation between genders, drawing upon several VBM studies that investigate structural GM changes due to this disease. However, in light of inconsistencies in previous researches, the present study aims to examine MRI data from both male and female participants (both ADHDs and controls) aged 7-14 years and employ just the VBM method to gain further insights.

2- Proposed Work and Methodology (including comprision, simulation/experimental results and discusion)

In this paper 587 structural MRI images (male ADHDs/male controls and female ADHDs/female controls) were extracted from the ADHD-200 database to investigate the GM density changes due to ADHD between males and females. This paper's methodology involved preprocessing, segmentation, registration, and statistical analysis using the SPM12 software. The results showed significant differences in GM density in various brain regions between ADHD patients and the healthy group, particularly in the posterior cingulate gyrus, precuneus, hippocampus, thalamus in male ADHDs, lingual gyrus in both male and female ADHDs, and cerebellum in female ADHDs. These findings suggest potential difficulties in cognitive and behavioral processes associated with ADHD in these patients.

3- Conclusion (4-5 lines)

The GM density changes in the posterior cingulate gyrus, precuneus, and hippocampus regions in boys ADHDs, suggested difficulties in emotion management, motivation, and memory. Also, the thalamus region in male ADHDs is more involvement than in female ADHDs. So, male ADHDs experience greater problems in visual processing, management of cognitive, behavioral, and motor functions. Furthermore, the lingual gyrus was affected by ADHD in both male and females which may cause problems related to visual processing. The cerebellum is more affected by ADHD in females than in males. This finding could be one of the factors contributing to the high occurrence of inattentiveness in ADHD girls.

بررسی تاثیر جنسیت بر علایم ناشی از بیماری بیش‌فعالی بر مبنای ارزیابی تغییرات تراکم ماده خاکستری مغز

مژده حدادپور

دانشجوی دکترا، مهندسی پزشکی (دانشکده مهندسی)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهدی سعادتمند

دانشیار، مرکز علوم و فناوری‌های شناختی فردوسی & آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فابریس والویس

استاد و پزشک، دانشکده پزشکی، دانشگاه پیکاردی ژول ورن، آمیان، فرانسه

چکیده

اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (ADHD) یکی از شایع‌ترین اختلالات دوران کودکی است که عمدتاً با سه علامت اصلی شامل بی‌توجهی، بیش‌فعالی و تکانش‌گری مشخص می‌شود. این علائم در دختران و پسران به‌صورت متفاوتی بروز می‌یابند. در این مطالعه، رابطه بین اختلال ADHD و تراکم ماده خاکستری (GM) مغز با تمرکز بر تفاوت‌های جنسیتی بررسی شده است. داده‌های تصویربرداری ساختاری MRI از پایگاه داده ADHD-200 استخراج گردید که شامل ۱۶۴ پسر سالم، ۲۲۷ پسر مبتلا به ADHD، ۱۲۹ دختر سالم و ۶۷ دختر مبتلا به ADHD در بازه سنی ۷ تا ۱۴ سال می‌باشد. از روش مورفومتری مبتنی بر واکسل (VBM) برای مقایسه تراکم ماده خاکستری بین گروه‌های ADHD و کنترل در هر جنس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در پسران، نواحی شکنج خلفی کمربندی، پیش‌گوه، هیپوکامپ و تالاموس، و در دختران، ناحیه مخچه به‌طور معناداری تحت تأثیر این اختلال قرار گرفته‌اند. این نواحی در فرایندهای شناختی مانند یادگیری، حافظه، تنظیم هیجان و پردازش بینایی نقش دارند؛ از این‌رو، پسران مبتلا به ADHD ممکن است در این عملکردها دچار اختلال شوند، در حالی که دختران بیشتر با مشکلات توجه مواجه‌اند.

کلمات کلیدی

اختلال نقص‌وجهی/بیش‌فعالی (ADHD)، مورفومتری مبتنی بر واکسل (VBM)، تفاوت‌های جنسیتی، تراکم ماده خاکستری، تصویربرداری ساختاری MRI، اختلالات عصبی‌رشدی.

نام نویسنده مسئول: دکتر مهدی سعادتمند

ایمیل نویسنده مسئول: saadatmand@um.ac.ir

تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

تاریخ (های) اصلاح مقاله: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۱-مقدمه

می‌دهد که این بیماری علاوه بر این‌که در کودکان پسر شیوع بالایی دارد، حتی نسبت به کودکان دختر نیز سریع‌تر تشخیص داده می‌شود [۴، ۵]. در این بیماری نیز همچون سایر اختلالات روانشناختی، به‌طور معمول روان‌پزشکان از پرسشنامه‌های از پیش طراحی شده، گزارش‌های والدین و معلمان، سابقه پزشکی و دیگر تست‌های کیفی مشابه استفاده می‌کنند [۶]. از طرفی امروزه محققان جهت تشخیص و درک دقیق اساس فیزیولوژیکی انواع اختلالات روانشناختی به ویژه بیماری بیش‌فعالی و بررسی تاثیر این بیماری بر مناطق مختلف مغزی، درکنار استفاده از این روش‌های بیان شده، از ارزیابی‌های کمی مبتنی بر سیستم‌های تصویربرداری عصبی ساختاری و عملکردی نظیر تصاویر MRI/fMRI و یا از تحلیل سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام استفاده

اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-ADHD) به عنوان یکی از اختلالات روانشناختی معمول در دوران کودکی به‌شمار می‌آید که می‌تواند با ایجاد مشکلات متعدد، زندگی شخصی و حتی خانوادگی بیمار را نیز مختل کند [۱]. ازجمله علایم شایع این اختلال روانشناختی می‌توان به سه شاخصه نقص‌توجه^۱، فعالیت بیش‌از حد^۲ و تکانشگری^۳ اشاره کرد [۲]. اگرچه عامل اصلی بیماری بیش‌فعالی هنوز مشخص نشده است، اما براساس تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره، تاثیر هر دو عامل ژنتیک و محیط در پیدایش این بیماری پررنگ‌تر می‌باشد [۳]. همچنین در رابطه با تاثیر ژنتیک و وراثت در ابتلا به بیماری بیش‌فعالی، تحقیقات نشان

³ Impulsivity

¹ Inattention
² Hyperactivity

می‌کنند [۷-۹]. برای این منظور پژوهشگران معمولاً از روش‌ها و ابزارهای متداولی نظیر روش مورفومتری مبتنی بر وکسل^۴ (VBM) جهت ارزیابی این تغییرات بهره می‌گیرند. در واقع این روش یک رویکرد محاسباتی آناتومیک عصبی بوده که با دارا بودن مراحل اصلی پیش‌پردازشی نظیر بخش‌بندی مغز^۵ به سه کلاس ماده خاکستری^۶ (GM)، ماده سفید^۷ (WM) و مایع مغزی نخاعی^۸ (CSF)، نرمالیزاسیون مکانی، هموارسازی^۹ و آنالیزهای آماری می‌تواند تفاوت‌های محلی تراکم بافت‌های مغزی به خصوص ماده خاکستری مغز (GM) را در اثر انواع اختلالات عصبی و روانی نظیر ADHD در سطح وکسل اندازه‌گیری کند [۱۰]. در این پژوهش نیز از روش VBM جهت ارزیابی تغییرات تراکم ماده خاکستری مغز (GM) در اثر بیماری ADHD بین دو گروه سالم و بیمار اعم از مذکر و مونث استفاده شده است.

بر این اوتنیک و همکاران [۲۰] نیز در بررسی تأثیر فاکتور جنسیت در طی یک مطالعه مبتنی بر حجم، کاهش حجم ناحیه هسته دمدار سمت راستی^{۱۶} را در مردان بیمار بیش‌فعال نسبت به گروه سالم هم‌جنس خود گزارش دادند. در مطالعه دیگری روش و همکاران [۲۱] نیز با انجام روش حجم‌سنجی مبتنی بر VBM بر روی بیماران بیش‌فعال ۴-۵ ساله، نشان دادند که این بیماری منجر به کاهش حجم نواحی هسته دمدار، گلوبوس پالیدوس و تالاموس در کودکان در سنین پیش از ورود به مدرسه می‌گردد که البته در کودکان پسر بین شدت علائم این بیماری و تغییرات حجم نواحی پوتامن و تالاموس همبستگی وجود داشت. همچنین لو و همکاران [۲۲] نیز کاهش حجم قابل توجه ناحیه پوتامن راست و در مقابل افزایش قابل توجه حجم ناحیه مربوط به میدان پیشانی چپ چشم^{۱۷} را در بیماران بیش‌فعال پسر ۷-۱۶ ساله نتیجه گرفتند. علاوه بر این نوع پژوهش‌ها، در یکی از متاآنالیزهای انجام گرفته شده توسط هاپینسون و همکاران [۲۳]، کاهش حجم قابل ملاحظه ناحیه کمپرسی مغز^{۱۸} را در بیماران زن مبتلا به ADHD نسبت به بیماران مرد و در مقابل کاهش حجم قابل ملاحظه ناحیه جسم پینه‌ای قدامی^{۱۹} در کودکان و نوجوانان پسر بیش‌فعال گزارش دادند. در حالت کلی در بیان نتایج هر کدام از مقالات به طور معمول به دلیل ناهمگونی جمعیت شرکت کننده، عدم در نظر گرفتن فاکتورهای مهم نظیر سن و جنسیت و بکاربردن روش‌های مختلف اندازه‌گیری، ناسازگاری‌های مشاهده می‌گردد. این پژوهش نیز جهت غلبه حداکثری بر این عدم سازگاری در نتایج و همچنین یافتن پاسخ به هدف اصلی و بنیادین وجود ارتباط بین دو مقوله دلیل وجود تفاوت‌ها در نوع و شدت بروز علائم بیماری بیش‌فعالی در دو جنس مذکر و مونث با یکدیگر و تغییرات تراکم GM بر روی نواحی خاصی از مغز در اثر این بیماری، تمامی داده‌های ساختاری MRI خود را در محدوده سنی مشخص (۷-۱۴ سال) و به صورت جداگانه در هر دو جنس مذکر و مونث تحت اعمال روش VBM قرار می‌دهد.

در حالت کلی این پژوهش در ادامه به صورتی که شرح داده می‌شود، قالب‌بندی می‌گردد. در بخش ۲ مبنای روش پیشنهادی توضیح داده می‌شود. در بخش ۳ نیز نتایج این پژوهش گزارش شده که در دو زیر قسمت پایگاه داده و گزارش نتایج شرح داده شده است. در بخش ۴ نیز به مقایسه و بحث این پژوهش در جهات مختلف با مطالعات پیشین (در قالب توأم توضیحات و جدول) پرداخته شده است. در نهایت بخش ۵ نیز به نتیجه‌گیری، جمع‌بندی کلی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی اختصاص داده شده است.

۲- شرح روش پیشنهادی

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پژوهش انجام شده به دنبال یافتن پاسخ این سوال اساسی می‌باشد که کدام یک از نواحی مغزی موجود بر روی ماده GM مغز تحت تأثیر بیماری بیش‌فعالی در دو جنس مذکر و مونث قرار می‌گیرد که در اثر این تأثیرپذیری، علائم متفاوت مرتبط با نقش‌های این نواحی (نواحی درگیر) در بیماران بیش‌فعال مذکر و مونث ظاهر می‌شود. در واقع یافتن پاسخ این سوال به عنوان اصلی‌ترین هدف و وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات مشابه در این زمینه می‌باشد. از این‌رو در راستای تحقق هدف مذکور، جهت ارزیابی تراکم GM در تصاویر MRI ساختاری بیماران بیش‌فعال در هر دو جنس مذکر و مونث، از روش تماماً خودکار VBM در جعبه ابزار CAT12 [۲۴] که در

پژوهش‌های متعددی از روش VBM در بیان تغییرات ساختاری مغز ناشی از بیماری بیش‌فعالی استفاده کرده‌اند. برای مثال، ویلگیس و همکاران [۱۱] هم با بکاربردن این روش دریافتند که بیماری ADHD در کودکان و نوجوانان منجر به کاهش حجم ماده خاکستری به صورت محلی در خوشه‌های موجود در نواحی پیشانی دو طرفه^{۱۰}، آهیانه‌ای راست^{۱۱} و گیجگاهی راست^{۱۲} در مقایسه با گروه افراد سالم می‌شود. به همین ترتیب، بوناس و همکاران [۱۲] نیز با استفاده از روش حجم‌سنجی VBM، کاهش حجم GM را در بیماران بیش‌فعال نوجوان ۱۱-۱۷ ساله در نواحی مربوط به قشر کمربندی قدامی^{۱۳}، قشر پس‌سری^{۱۴}، هیپوکامپ/آمیگدال دو طرفه و مخچه نتیجه گرفتند. از طرفی با در نظر گرفتن عامل جنسیت به عنوان یکی از عوامل مهم در شیوع بیماری ADHD و همچنین بروز علائم مرتبط شناخته شده با این بیماری [۱۳]، تحقیقات نشان می‌دهد که مردان در مقایسه با زنان (با نسبت تقریبی ۴ به ۱) به طور کلی پتانسیل بیشتری در ابتلا و تشخیص بیماری بیش‌فعالی دارند [۱۴، ۱۵]. همچنین نتایج یکی از پژوهش‌های معروف مبتنی بر فاکتور جنسیت، دلیل مهم و اصلی شیوع گسترده بیماری بیش‌فعالی در مردان نسبت به زنان و همچنین تشخیص سریع این بیماری در جنس مذکر را در بروز علائم بیماری ADHD به صورت واضح در جنس مذکر عنوان کرده است [۱۶]. به طوری که در کودکان پسر بیش‌ترین علائم بیماری بیش‌فعالی در زمینه فعالیت بیش از حد و رفتارهای تکانشی ظاهر شده و در کودکان دختر علائم بی‌توجهی و بی‌دقتی پررنگ‌تر می‌باشد، لذا والدین کودکان پسر سریع‌تر از والدین کودکان دختر متوجه بیماری بیش‌فعالی در فرزندانشان شده و اقدامات تشخیصی و درمانی را زودتر شروع می‌کنند [۱۷، ۱۸]. علاوه بر ارزیابی‌ها و تشخیص کیفی این بیماری، تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از دلایل شایع بروز هرگونه علائم بیماری بیش‌فعالی در هر دو جنس مذکر و مونث را می‌توان به تغییرات ساختاری در نواحی مختلف مغزی مرتبط با هر کدام از این علائم نسبت داد. در این راستا، در پژوهشی که توسط سیمور و همکاران [۱۹] در زمینه تأثیر بیماری بیش‌فعالی در دو جنس مذکر و مونث انجام گرفته شده بود، نشان دادند که این بیماری در کودکان پسر ۸-۱۲ ساله منجر به کاهش قابل توجه حجم در نواحی گلوبوس پالیدوس دوطرفه^{۱۵}، آمیگدال و هیپوکامپ نسبت به هموعان سالم خود می‌گردد. این در حالی است که در کودکان دختر بیمار تغییرات ساختاری قابل توجهی مشاهده نشد. علاوه

¹² Right temporal
¹³ Anterior cingulate cortex
¹⁴ Occipital cortex
¹⁵ Bilateral globus pallidus
¹⁶ Right caudate nucleus
¹⁷ Frontal eye field
¹⁸ Splenium
¹⁹ Anterior corpus callosum

⁴ Voxel Based Morphometry (VBM)
⁵ Segmentation
⁶ Gray Matter
⁷ White Matter
⁸ CerebroSpinal Fluid
⁹ Smoothing
¹⁰ Bilateral frontal
¹¹ Right parietal

تصاویر MRI ورودی اعم از سالم و بیمار بیش‌فعال این‌بار با تصویر الگوی استاندارد مرجع جدید با همان روش تطبیق مستوی اعتمادی و همکاران [۲۷]، به فضای استاندارد MNI نگاشت داده می‌شوند. بلوک بعدی پس از اعمال تطبیق داده‌های ورودی، مربوط به نگاشت تمامی تصاویر GM استخراج شده در فضای اصلی تصویر به فضای استاندارد، جهت انجام مابقی مراحل پردازشی نظیر تحلیل‌های آماری پژوهش می‌باشد. واضح است که هر تصویر MRI ورودی خام جهت نگاشت به فضای استاندارد با تصویر الگوی استاندارد جدید ساخته شده در این پژوهش، با تبدیل بهینه مشخص و منحصر به فردی نگاشت می‌یابد. حال در این پژوهش هریک از این تبدیل‌های بهینه مستخرج مختص هر تصویر، بر تصاویر GM بدست آمده در فضای اصلی آن‌ها اعمال می‌گردد. نتیجه این نگاشت به صورت تصاویر GM در فضای استاندارد، که در این بلوک دیاگرام به صورت نمادین مخزن مشخص شده است، ذخیره می‌گردد. در روش VBM به کارگرفته شده در این مطالعه، جهت بهبود دقت بخش‌بندی بافت‌ها و کاهش نویز احتمالی موجود در فرایندهای تطبیق و بخش‌بندی، تمامی تصاویر GM موجود در مخزن در بلوک دیاگرام شکل ۱ تحت عملیات هموارسازی توسط کرنل گاوسی (عرض ۸ میلی‌متر) قرار می‌گیرند. حال پس از این مرحله، نوبت به پاسخ دادن به سوال بنیادین نگارش این مقاله "اختلال و تغییرات ساختاری در کدام یک از نواحی مغزی موجود بر GM مغز، منجر به بروز علائم متفاوت در بیماران بیش‌فعال مذکر و مونث می‌گردد؟" می‌باشد. این مرحله در بلوک‌های مربوط به انجام آنالیزهای آماری قابل دریافت می‌باشد. برای این منظور در این بلوک دیاگرام، روش آزمون t دو نمونه ای (2sample t-Test) در نرم‌افزار SPM12 جهت تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش انتخاب شده است. لازم به ذکر است که این آزمون آماری در دو مرتبه مابین بیماران مذکر بیش‌فعال و گروه سالم مذکر و بیماران بیش‌فعال مونث و گروه سالم مونث انجام گرفته شده است. همچنین در تعریف مدل آماری مورد استفاده در این مطالعه، فاکتورهای سن و دست راستی و چپی بودن به عنوان متغیرهای کمکی و حجم کل GM به عنوان معیار اندازه‌گیری عمومی در هر آنالیز گروهی جنس مذکر و مونث انتخاب شده است. در گام بعدی پس از ساخته شدن مدل آماری در هر دو آنالیز گروهی جنس مذکر و مونث، می‌بایست خوشه‌هایی متشکل از وکسل‌هایی با ویژگی‌های مشابه مشخص گردد. در واقع خوشه‌بندی در روش VBM امکان شناسایی و گروه‌بندی وکسل‌ها بر اساس ویژگی‌های آماری آن‌ها را فراهم کرده تا الگوهای فضایی تغییرات مغز در اثر اختلالات روانشناختی نظیر ADHD مشخص گردد. به طور معمول هر پژوهشی جهت گزارش نتایج خود، حداقل تعداد وکسل‌ها در هر خوشه را مشخص می‌کند. در این پژوهش نیز فقط خوشه‌های بیشتر از ۱۰ وکسل گزارش شده است. همچنین شایان ذکر است که در این پژوهش تمام آنالیزهای آماری با تفاوت معنی دار (P value=0.05) انجام گرفته شده است. گام نهایی در بلوک دیاگرام ترسیم شده به تعیین اسامی نواحی مغزی که خوشه‌های تعیین شده در مرحله قبل آن‌ها را در بر گرفته‌اند، مربوط می‌شود که تحت عنوان فرایند جزنگاری^{۲۵} انجام می‌پذیرد. در این پژوهش جهت انجام این فرایند از اطلس برچسب‌گذاری شده AAL3v1 [۲۸] به دلیل دارا بودن مزایای مهمی چون وضوح فضایی دقیق، تعریف بخش‌های فرعی نظیر قشرکمربندی قدامی، هسته‌های مختلف تالاموس و سایر نواحی مغزی، نتایج جامع‌تری را نسبت به سایر اطلس‌های برچسب‌گذاری شده پیشین ارائه می‌دهد. نتایج این مرحله از بلوک دیاگرام به صورت تعیین نواحی مغزی با اختلاف تراکم GM قابل توجه بین بیماران ADHD و گروه سالم در هر دو گروه مذکر و مونث، ثبت می‌گردد.

نرم‌افزار SPM12 [۲۵] موجود است، استفاده شده است. از آنجایی که این روش تراکم ماده خاکستری مغز را به صورت وکسل به وکسل ارزیابی می‌کند، لذا نتایج بدست آمده در این پژوهش دقیق‌تر و جامع‌تر خواهد بود.


روش به کار گرفته شده در این پژوهش به صورت گام به گام در بلوک دیاگرام شکل ۱ نشان داده شده است. اولین مرحله در این بلوک دیاگرام در رابطه با عملیات پردازشی اولیه بر روی داده‌های ورودی تصاویر MRI می‌باشد. یکی از موارد مهمی که قبل از توضیح درباره عملیات اولیه پردازشی می‌بایست بر آن تاکید گردد، شرط محدودیت سنی (۷-۱۴ سال) و همچنین انتخاب تعداد بالایی (۱۶۴ مورد سالم مذکر و ۱۲۹ مورد سالم مونث، ۲۲۷ مورد بیمار بیش‌فعال مذکر و ۶۷ نمونه بیش‌فعال مونث) از داده‌های تصویربرداری MRI در هر دو جنس مذکر و مونث می‌باشد. از آنجایی که بیماری بیش‌فعالی جز یکی از اختلالات روانشناختی تکاملی می‌باشد، لذا در نظر گرفتن رنج سنی ۷-۱۴ سال در انتخاب داده‌ها را می‌توان به عنوان یکی از نقاط قوت این پژوهش لحاظ کرد. چرا که این بازه سنی در فرایند رشد و تکامل دوران کودکی و ورود به دوران اوایل نوجوانی در بررسی علائم بیماری بیش‌فعالی در هر دو جنس مذکر و مونث جز گروه‌های سنی مهم تلقی می‌شود. علاوه بر شرط محدودیت سنی لحاظ شده در این پژوهش، فراوانی جمعیت داده‌های MRI انتخاب شده نیز می‌تواند در بالا بردن اطمینان از نتایج حاصل شده سهم موثری را ایفا کند. در رابطه با عملیات پردازشی اولیه بر روی داده‌های ورودی بر طبق این بلوک دیاگرام، ابتدا تمام تصاویر ورودی MRI اعم از سالم و بیش‌فعال به دو دسته مجزای مذکر و مونث تقسیم می‌شوند. سپس تمامی تصاویر ورودی با استفاده از جعبه ابزار CAT12 [۲۴] در فضای اصلی تصویر تحت اعمال فرایندهای پیش‌پردازشی و بخش‌بندی قرار می‌گیرند. نتیجه پردازش‌های حاصل از این گام به صورت تصاویر GM در فضای اصلی هر تصویر توسط جعبه ابزار CAT12 می‌باشد.

همچنین یکی دیگر از موارد مهمی که در این پژوهش بدان توجه شده است به‌کارگیری روش‌های پردازشی به‌روز و پرکاربردی چون CAT12 در بخش‌بندی تصاویر ورودی MRI می‌باشد. این نرم‌افزار آنالیزی به دلیل دارا بودن ویژگی‌های بارزی چون به روز بودن، بخش‌بندی محلی تطبیق داده شده^{۲۰}، بخش‌بندی بیشینه تطبیق پسینه^{۲۱} (AMAP)، بخش‌بندی جزئی حجم^{۲۲}، درون‌یابی داخلی، حذف نویز، پیش‌پردازش‌های مستوی و نرمال‌سازی مکانی معمولاً عملکرد بهتری را در مطالعات تجزیه و تحلیل‌های تغییرات ساختاری نواحی مختلف مغزی به نسبت VBM8 و یا SPM12 ارائه می‌دهد [۲۶]. گام بعدی در این بلوک دیاگرام رسم شده مربوط به اعمال پردازش‌های مربوط به تطبیق سخت مستوی^{۲۳} جهت برطرف کردن تفاوت‌های کلی و فیزیولوژیکی هر تصویر خام ورودی نظیر اندازه و جهت‌گیری سر با تصویر الگوی مرجع استاندارد می‌باشد. در این پژوهش تصاویر ورودی دو مرتبه با تصاویر مرجع استاندارد ICBM152 و تصویر الگوی جدید) تطبیق داده می‌شوند. به‌طوری که به منظور ساختن تصویر الگوی مرجع استاندارد جدید مختص داده‌های این پژوهش، ابتدا تمامی تصاویر MRI سالم ورودی با تصویر مرجع استاندارد ICBM152 توسط روش پیشنهاد داده شده اعتمادی و همکاران [۲۷] تحت اعمال تطبیق مستوی قرار می‌گیرند. به طوری که اساس کلی این روش تطبیق بر مبنای بدست آوردن تبدیل بهینه از طریق بیشینه کردن ضریب همبستگی متقاطع^{۲۴} و الگوریتم نزولی گرادینت تطبیقی، می‌باشد. در ادامه از تمامی تصاویر تطبیق یافته سالم در مرحله پیشین میانگین‌گیری کرده و به عنوان تصویر الگوی مرجع استاندارد جدید در سایر مراحل پردازشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گام بعدی تمامی


²³ Affine registration²⁴ Cross-correlation coefficient²⁵ Parcellation²⁰ Local adaptive segmentation²¹ Adaptive maximum a posteriori-AMAP²² Partial volume

مرد گزارش دادند. این در حالی است که ناکانو و همکاران [۳۲] افزایش حجم GM در دو ناحیه شکنج خلفی کمربندی و پیش‌گوه در بیماران بیش‌فعال بدون در نظر گرفتن جنسیت نتیجه گرفتند. از طرفی، ناحیه شکنج زبانه‌ای که یکی دیگر از زیرنواحی‌های قشر مغزی به حساب می‌آید که در هر دو جنس مذکر و مونث در اثر بیماری ADHD، افزایش تراکم GM داشته است. افزایش حجم GM در ناحیه شکنج زبانه‌ای در بیماران بیش‌فعال بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت در مطالعه پیشین توسط حدادپور و همکاران [۳۳] نیز گزارش شده بود. در مقابل در پژوهش انجام گرفته شده توسط گونجیق‌سورن و همکاران [۳۴]، کاهش حجم GM در شکنج زبانه‌ای در بیماران بیش‌فعال پسر نتیجه گرفته شده است. در حالت کلی این سه ناحیه (شکنج خلفی کمربندی، پیش‌گوه و شکنج زبانه‌ای) موجود در قشر GM مغزی به ترتیب در مدیریت طیف وسیعی از فرایندهای شناختی، رفتاری، نظیر حافظه فضایی، پردازش‌های بینایی/فضایی، بازیابی حافظه، عملیات خودپردازشی و بینایی نقش مهمی دارند [۳۵-۳۷]. از آرو این امکان وجود دارد که بیماران ADHD با مشکلاتی مرتبط با موارد بیان شده در زندگی شخصی و آینده خود مواجه شوند. همچنین براساس نتایج گزارش شده در این پژوهش، دو ناحیه هیپوکامپ (فقط در بیماران مذکر) و تالاموس (در هر دو جنس مذکر و مونث) جز ناحیه زیر قشر مغزی در اثر بیماری بیش‌فعالی تغییرات تراکم GM داشته‌اند. در رابطه با تاثیرپذیری ناحیه هیپوکامپ و با صرف‌نظر از دخالت فاکتور جنسیت، اوننیک و همکاران [۲۰] کاهش حجم این ناحیه را در بیماران بیش‌فعالی که همزمان سابقه افسردگی مزمن داشته و همچنین تحت مصرف دارو قرار گرفته بودند در مقایسه با گروه افراد سالم گزارش دادند. ونگ و همکاران [۳۸] نیز در پژوهش خود نشان دادند که حجم ناحیه هیپوکامپ در اثر بیماری بیش‌فعالی در گروه مذکر بیمار کاهش یافته است. در واقع اصلی‌ترین نقش هیپوکامپ را می‌توان به تثبیت اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت و تشکیل خاطرات اپیزودیک یا اتوبیوگرافیک جدید از طریق تشخیص رویدادها، مکان‌ها و محرک‌های جدید نسبت داد [۳۹]. لذا این احتمال وجود دارد که بیماران بیش‌فعال پسر به دلیل درگیر شدن ناحیه هیپوکامپ، دچار مشکلاتی در زمینه مدیریت حافظه نیز شوند. از طرفی ناحیه تالاموس اگرچه در هر دو جنس مذکر و مونث درگیر بیماری بیش‌فعالی شده است، اما با این وجود در بیماران پسر هم تنوع هسته‌های درگیر این ناحیه و هم مجموع تراکم GM تغییر یافته در اثر ADHD به نسبت کودکان بیمار دختر بیشتر می‌باشد. در مجموع این ناحیه به عنوان یک پایگاه اصلی در مغز، در مدیریت و تنظیم اطلاعات حسی بدن نظیر بینایی و شنوایی، تنظیم خواب، هوشیاری، یادگیری، حافظه و انتقال و تعدیل اطلاعات بینایی نیز دخیل می‌باشد [۴۰-۴۲]. به‌طور جزئی‌تر در بیان نقش‌های برخی از هسته‌های ناحیه تالاموس می‌توان عنوان کرد که، هسته‌های داخلی و قدامی تالاموس در تنظیم حافظه و احساسات نقش داشته، در حالی که هسته‌های داخلی در تنظیم برانگیختگی و توجه نقش دارند. همچنین هسته پولوینار^{۲۹} به عنوان بزرگترین هسته تالاموس با تقسیم شدن به سه قسمت میانی، قدامی و تحتانی به ترتیب در یکپارچه کردن اطلاعات حسی از روش‌های مختلف، توجه و ادراک و پردازش‌های مربوط به بینایی نقش مهمی ایفا می‌کنند [۴۳]. علاوه براین، هسته جنیکولیت^{۳۰} این ناحیه نیز در مدیریت و تنظیم پردازش‌های مربوط به بینایی نقش دارند [۴۰]. به‌طور مشابه، فو و همکاران [۴۴] و ایوانو و همکاران [۴۵] نیز افزایش تراکم GM را در ناحیه تالاموس برای بیماران بیش‌فعال نتیجه گرفتند. با این حال بتی و همکاران [۴۶] و روش و همکاران [۲۱]، کاهش حجم ناحیه تالاموس را در بیماران ADHD در مقایسه با گروه افراد سالم گزارش کردند. همچنین زیرنواحی مخچه نیز در هر دو جنس بیماران

که در بیماران مذکر هم تنوع زیرنواحی ورمیس و هم تغییر تراکم GM نسبت به بیماران مونث بیشتر می‌باشد.



شکل ۲- نمایش شماتیک تعدادی از خوشه‌های استخراج شده در آنالیزهای گروهی مذکر و مونث در اثر بیماری ADHD. (الف): آنالیز کاهش تراکم GM در بیماران جنس مذکر، (ب): آنالیز افزایش تراکم GM در بیماران جنس مذکر، (ج): آنالیز کاهش تراکم GM در بیماران جنس مونث، (د): آنالیز افزایش تراکم GM در بیماران جنس مونث.



شکل ۳- نمایش برش سه بعدی (نمای جانبی) تعدادی از خوشه‌های استخراج شده در آنالیزهای گروهی مذکر و مونث در اثر بیماری ADHD (الف): آنالیز کاهش تراکم GM در بیماران جنس مذکر، (ب): آنالیز افزایش تراکم GM در بیماران جنس مذکر، (ج): آنالیز کاهش تراکم GM در بیماران جنس مونث، (د): آنالیز افزایش تراکم GM در بیماران جنس مونث.

۴-مقایسه و بحث بر روی نتایج

این قسمت از پژوهش به مقایسه و بحث بر روی نتایج بدست آمده با مطالعات پیشین مرتبط اختصاص داده شده است. از این‌رو در هر دو قالب بیان توضیحات و جدول مقایسه‌ای در رابطه با این موضوع بحث خواهد شد.

همان‌طور که در قسمت گزارش نتایج بدان اشاره گردید، دو ناحیه شکنج خلفی کمربندی و پیش‌گوه فقط در بیماران مذکر بیش‌فعال نسبت به هموعان سالم خود دچار کاهش تراکم GM شده‌است. کاهش حجم این دو ناحیه بدون لحاظ کردن فاکتور جنسیت در پژوهش کارمونا و همکاران [۳۰] نیز گزارش شده است. همچنین در رابطه با تاثیرپذیری ناحیه پیش‌گوه، نیکل و همکاران [۳۱] نیز کاهش حجم GM در این ناحیه را فقط در بیماران بیش‌فعال

³⁰geniculate

²⁹ Thal-Pulvinar

عملکرد منطقی دارد. چرا که بالا بودن فراوانی جمعیت داده‌ها در هر پژوهشی منجر به بالا رفتن قابلیت اطمینان و دقت در نتایج بدست آمده می‌گردد. همچنین در رابطه با شرط محدودیت سنی این پژوهش در انتخاب داده‌ها می‌توان ادعا کرد که بیماری بیش‌فعالی به دلیل آن‌که جز یکی از اختلالات روانشناختی تکاملی می‌باشد، لذا این رنج سنی (۷-۱۴ سال) به عنوان بازه مهم و حیاتی در رشد و تکامل دوران کودکی و اوایل نوجوانی در بررسی علایم بیماری بیش‌فعالی در هر دو جنس مذکر و مونث به حساب می‌آید. علاوه بر این، نکته مهم دیگر در بیان تفاوت‌ها و برتری‌های این پژوهش نسبت به سایر پژوهش‌های متفاوت در این زمینه می‌توان به انتخاب نوع روش پردازشی و ابزارهای پردازشی مورد استفاده در این پژوهش اشاره کرد. به طوری‌که در این مطالعه جهت ارزیابی تغییرات تراکم ماده خاکستری مغز در اثر بیماری بیش‌فعالی به صورت جداگانه در دو جنس مذکر و مونث از روش تماماً خودکار VBM موجود در جعبه ابزار CAT12 استفاده شده است. از آنجایی که این روش تراکم ماده خاکستری مغز را به صورت وکسل به وکسل ارزیابی می‌کند، لذا نتایج دقیق‌تری بدست خواهد آمد. همچنین استفاده از نرم‌افزار آنالیزی CAT12 جهت بخش‌بندی داده‌های تصویربرداری با مزایای که پیش‌تر به آن‌ها پرداخته شده است و به کارگیری الگوریتم تطبیق مستوی (پاسخ سوال ۵-دور اول-جزئی) جدید پیشنهاد داده شده توسط اعتمادی و همکاران [۲۷]، از دیگر تفاوت‌ها و برتری‌های این پژوهش نسبت به سایر مقالات در این زمینه به حساب می‌آید. در نهایت در رابطه با جمع‌بندی نتایج بدست آمده در این پژوهش، پی‌بردن به وجود ارتباط بین تغییرات آناتومیک نواحی نظیر شکنج‌های خلفی کمربندی، پیش‌گوه، هیپوکامپ و تالاموس در بیماران بیش‌فعال مذکر و ناحیه مخچه در بیماران بیش‌فعال مونث با پاتوفیزیولوژی بیماری بیش‌فعالی از طریق در نظر گرفتن عملکردهای اصلی هر کدام از این نواحی تغییر ساختاریافته مذکور در مغز می‌باشد.

۵- نتیجه‌گیری

در این قسمت خلاصه نتایج این پژوهش شرح داده شده و به نتیجه‌گیری کلی از این پژوهش پرداخته می‌شود. از آنجایی که سه ناحیه شکنج خلفی کمربندی، پیش‌گوه و هیپوکامپ که فقط در کودکان بیش‌فعال پسر دچار تغییرات تراکم GM در اثر این بیماری شده‌اند، لذا با در نظر گرفتن وظایف اصلی این سه ناحیه که پیش‌تر ذکر شده‌است، می‌توان این احتمال را داد که بیماران ADHD پسر به نسبت کودکان بیمار دختر، بیشتر در معرض مشکلاتی نظیر مدیریت احساسات، انگیزه و به خصوص حافظه در دوران کودکی و نوجوانی خود قرار می‌گیرند. همچنین ناحیه شکنج زبانه‌ای که در هر دو جنس مذکر و مونث تحت تاثیر بیماری بیش‌فعالی قرار گرفته بود، این امکان وجود دارد که این بیماران در پردازش‌های مربوط به بینایی نیز دچار مشکل شوند. علاوه بر این، به دلیل تاثیرپذیری بالای ناحیه تالاموس در بیماران بیش‌فعال مذکر و با در نظر گرفتن نقش‌های اصلی این ناحیه، احتمال بروز اختلالات مربوط به پردازش‌های بینایی، فرایندهای شناختی، رفتاری و حرکتی در این بیماران به نسبت بیماران بیش‌فعال دختر بالا می‌باشد. در نهایت با توجه به اینکه هم مجموع تغییرات تراکم GM و هم تنوع زیرنواحی‌های درگیر مخچه در اثر بیماری بیش‌فعالی در بیماران جنس مونث بیشتر از بیماران جنس مذکر می‌باشد، لذا با در نظر گرفتن نقش این ناحیه در فرایندهای شناختی مهم نظیر توجه، می‌توان ادعا کرد که در کودکان بیمار دختر به نسبت کودکان بیمار پسر، علایم بی‌توجهی مشهودتر باشد. همچنین در جهت بهبود این پژوهش می‌توان در مطالعات آتی جهت بدست آوردن نتایج بهتر و دقیق‌تر، از مواردی نظیر به‌کارگیری مطالعات طولی، بررسی علایم بیماری بیش‌فعالی در هر دو جنس مذکر و مونث در طبقه‌بندی‌های سنی مشخص مانند دو سال، بررسی همزمان

بیش‌فعال مذکر و مونث درگیر این بیماری شده‌اند. با این حال این درگیری در کودکان دختر ADHD به نسبت کودکان بیمار پسر بیشتر بوده و عمدتاً به صورت مطلقاً افزایشی و دوطرفه (نیمکره راست و چپ) نیز می‌باشد. در رابطه با نقش اصلی ناحیه مخچه، با وجود این‌که این ناحیه دارای نقش اصلی در زمینه کنترل حرکتی و تعادل می‌باشد، اما با این حال در تنظیم عملکردهای شناختی نظیر توجه، تمرکز، زبان، خواندن کلمات و کنترل هیجانی نیز نقش دارد [۴۷]. در این باره برخی از مطالعات نیز نشان دادند که ناحیه مخچه ممکن است در تعدیل توجه عاطفی و احساسی نیز دخیل باشد [۴۹]. یافته فوق در واقع یکی از دلایل شایع بودن علامت بی‌توجهی/بی‌دقتی در کودکان دختر بیش‌فعال به نسبت بیماران پسر را توجیه می‌کند. همچنین این نتیجه با نتایج پژوهش منتشر شده توسط کلینیک کلیولند (Cleveland Clinic) در زمینه شایع بودن علامت بی‌توجهی در زنان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی سازگاری دارد. علاوه بر این محققان مدعی شده‌اند که اگرچه بیماران بیش‌فعال مونث از مشکلاتی نظیر فعالیت بیش از حد و رفتارهای تکانشی در کنار مشکلات عدم توجه و تمرکز رنج می‌برند، اما علامت بی‌توجهی در آن‌ها به نسبت دیگر علایم این بیماری مشهودتر می‌باشد [۵۰]. ویلدالن و همکاران [۵۱] نیز واضح بودن علامت بی‌توجهی در زنان بیش‌فعال نسبت به مردان بیش‌فعال نتیجه گرفتند. علاوه بر درگیری ناحیه مخچه در اثر بیماری بیش‌فعالی، ناحیه ورمیس و زیرنواحی آن نیز در هر دو جنس مذکر و مونث بیش‌فعال افزایش تراکم GM داشته است. به طوری‌که فراگیری این بیماری در ناحیه ورمیس در بیماران مذکر به نسبت بیماران مونث مشهودتر می‌باشد. از نظر موقعیت آناتومیکالی، ناحیه ورمیس با قرار گرفتن در داخل مخچه نخاعی، ورودی‌های حسی را از سر و قسمت‌های نزدیک بدن از طریق مسیرهای نخاعی صعودی دریافت کرده و هرگونه آسیب و اختلالات این ناحیه می‌تواند منجر به افسردگی بالینی، نمایش عاطفی رفتارهای نامناسب و همچنین اختلالات حرکتی در این بیماران نیز گردد [۵۲]. اگرچه تغییرات تراکم GM مخچه و ورمیس در اثر بیماری بیش‌فعالی در اکثر مطالعات پیشین به صورت کاهشی گزارش شده‌اند [۵۳، ۵۴]، اما با این حال در یکی از مطالعات، محققان افزایش حجم برخی از زیرنواحی مخچه و ورمیس را در بیماران ADHD پسر در مقابل گروه افراد سالم گزارش دادند [۵۵].

تا به این قسمت از پژوهش، با در نظر گرفتن نقش‌های اصلی هر کدام از نواحی درگیر شرح داده شده در اثر بیماری بیش‌فعالی، دلیل وجود برخی از تفاوت‌های موجود در نوع بروز علایم ADHD در دو جنس مذکر و مونث را با تغییرات تراکم GM مغز در اثر این بیماری (هم‌راستا با هدف اصلی این پژوهش) قابل توجیه می‌کند. همچنین در ادامه، این پژوهش با ۷ مقاله مشابه دیگر از لحاظ هدف اصلی هر مطالعه، ویژگی‌های داده‌های مورد استفاده، روش به‌کار گرفته شده و همچنین نتایج بدست آمده در قالب جدول شماره ۳ مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد که این مقاله را از مطالعات پیشین متمایز می‌کند. جمع‌بندی مواردی که در هر کدام از زیربخش‌های این مقاله در رابطه با وجه تمایز این مقاله با سایر مقالات به صورت موردی بیان شده بود و همچنین مطالب جدول شماره ۳ نشان می‌دهد که این پژوهش ابتدا از لحاظ هدف اصلی مقاله که یافتن دلیل وجود اختلاف در بروز علایم بیماری بیش‌فعالی در دو جنس مذکر و مونث با یکدیگر با تغییرات تراکم GM در اثر این بیماری می‌باشد، با سایر مقالات مشابه تفاوت اصلی و بنیادین دارد. این در حالی است که سایر مقالات مشابه به طور دقیق‌تر و واضح‌تر به این مقوله نپرداخته بودند. نکته دیگر در رابطه با ویژگی داده‌های مورد استفاده در این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش‌های مشابه شرح داده شده می‌باشد. به طوری‌که این مطالعه هم از لحاظ فراوانی جمعیت داده‌های مورد استفاده در هر دو جنس مذکر و مونث (۲۹۳ داده سالم و ۲۹۴ داده بیمار بیش‌فعال) و هم از لحاظ رنج سنی داده‌های تصویربرداری (۷-۱۴ سال) از دیگر مقالات مشابه در این زمینه متفاوت بوده و

تقدیر و تشکر

این پژوهش/توسعه فناوری/محصول بر اساس قرارداد شماره ۹۴ پ ۹۵ توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ایران مورد حمایت قرار گرفته است

تصاویر ساختاری و عملکردی (fMRI/MRI) در ارزیابی عملکرد نواحی تحت تاثیر بیماری بیش‌فعالی، گنجانیدن داده‌های بزرگسال جهت بررسی روند تغییرات GM و علائم این بیماری در دو جنس مذکر و مؤنث در دوران بزرگسالی و همچنین استفاده ترکیبی از روش‌های یادگیری عمیق و روش VBM در تحلیل و آنالیز داده‌های تصویربرداری استفاده کرد.

جدول ۱- شناسایی خوشه‌های معنی‌دار استخراج‌شده در دو جنس مذکر و مؤنث که شامل برچسب خوشه، تعداد وکسل‌های معنی‌دار، تعیین نیمکره‌های مغز (Left-L/Right-R) و نوع خوشه (کاهش تراکم محلی = ↓ یا افزایش تراکم محلی = ↑)

رنج سنی	مذکر				مؤنث			
	برچسب	تعداد وکسل‌ها	L/R (چپ/راست)	افزایش/کاهش	برچسب	تعداد وکسل‌ها	L/R (چپ/راست)	افزایش/کاهش
۷-۱۴ سال	Mi	20	L	↓	Fi	1100	L	↓
	Mii	2	L	↓	Fii	121	R	↓
	Miii	15	R	↓	Fiii	290	L&R	↑
	Miv	9	L	↓	Fiv	10	L	↑
	Mv	34	L&R	↑	Fv	314	L	↑
	Mvi	1622	L&R	↑	Fvi	22	R	↑
	Mvii	191	R	↑	Fvii	32	R	↑
					Fviii	7	L	↑
					Fix	12	R	↑

جدول ۲. مقایسه تفاوت‌های تراکم GM در نواحی مغزی استخراج شده در اثر بیماری ADHD در دو جنس مذکر و مؤنث نسبت به هم‌نوعان سالم.

	نواحی مغزی		تغییرات غلظت GM در مؤنث (mm ³)	تغییرات غلظت GM در مذکر (mm ³)
قشر مغزی	Cingulate_Post-(L R)		- -	14↓ 24↓
	Lingual-(L R)		7↑ -	14↑ -
	Precuneus-(L R)		- -	- 3↓
زیر قشر مغزی	Hippocampus-(L R)		- -	7↑, 24↓ 24↓
	هیپوکامپس	Thal_VPL-(L R)	- 37↑	3↑ 253↑
		Thal_IL-(L R)	- -	78↑ 24↑
		Thal_LGN-(L R)	- -	10↑ 91↑
		Thal_MGN-(L R)	3↑ 3↑	41↑ 27↑
		Thal_PuA-(L R)	- -	57↑ 37↑
		Thal_PuM-(L R)	- -	152↑ 37↑
		Thal_PuI-(L R)	14↑ -	122↑ 176↑
مخچه و وریمیس	Cerebellum_Crus2-(L R)		176↓ 14↓	- -
	Cerebellum_3-(L R)		334↑ 74↑	834↑ 1104↑
	Cerebellum_4_5-(L R)		625↑ 78↑	675↑ 581↑
	Cerebellum_6-(L R)		101↑ 30↑	- -
	Cerebellum_7b-(L R)		577↓ 68↓	- -
	Cerebellum_8-(L R)		2960↓ 327↓,3↑	68↓ -
	Cerebellum_9-(L R)		361↑ 503↑	81↑ 20↑
	Vermis_1_2		27↑	172↑
	Vermis_3		74↑	425↑
	Vermis_4_5		-	999↑
	Vermis_9		111↑	14↑

جدول ۳- بررسی ۷ مقاله مشابه با این پژوهش از لحاظ هدف اصلی هر مطالعه، روش مورد استفاده، ویژگی‌های داده‌ها و همچنین نتایج بدست آمده

پژوهش	هدف اصلی پژوهش	روش مورد استفاده	نوع و تعداد داده‌ها	نتایج بدست آمده
ماهون و همکاران [۵۶]	بررسی حجم لوب پیشانی در پسران و دختران مبتلا به ADHD بر اساس زیربخش‌های مرتبط با عملکرد هرناحیه	استفاده از روش‌های حجم‌سنجی براساس عملکرد هر زیر ناحیه از لوب پیشانی	MRI ۴۴ پسر (۲۱ بیش فعال/ ۲۳ سالم) ۴۲ دختر (۲۱ بیش فعال/ ۲۱ سالم) رنج سنی: ۸-۱۳ سال	- کاهش حجم GM در بیماران بیش فعال مذکر و مونث در ناحیه کمپلکس حرکتی تکمیلی ^{۳۱} - کاهش حجم GM در قشر پیش حرکتی جانبی چپ ^{۳۲} در بیماران بیش فعال مونث
ونگ و همکاران [۳۸]	بررسی تفاوت‌های جنسیتی خاص در تغییر شکل نواحی زیر قشر مغزی بیماران بیش فعال در مقایسه با گروه افراد سالم	استفاده از روش‌های حجم‌سنجی دستی انتخاب ناحیه مدنظر جهت بخش‌بندی نواحی زیر قشر مغزی	MRI ۲۰۴ بیمار بیش فعال (۱۲۹ مذکر/ ۷۵ مونث) رنج سنی: ۶-۱۷ سال	- کاهش حجم نواحی اکامبنس ^{۳۳} ، آمیگدالا و هیپوکامپ و همچنین افزایش حجم ناحیه گلیوس پالیدوس ^{۳۴} در بیماران بیش فعال مذکر - عدم وجود تفاوت قابل توجه در دختران بیش فعال
ویلمونتیکس و همکاران [۵۷]	بررسی چگونگی تأثیر جنسیت بر ساختار مغز کودکان مبتلا به ADHD در هر دو جنس مذکر و مونث	استفاده از روش VBM بهینه شده	MRI ۳۰ پسر (۱۷ بیش فعال ترکیبی/ ۱۳ سالم) ۳ دختر (۱۶ بیش فعال ترکیبی/ ۱۴ سالم) رنج سنی: ۷-۱۵ سال	- کاهش حجم GM در بیماران بیش فعال مذکر نسبت به هموعان سالم در ناحیه قشر کمر بندی قدامی شکمی - افزایش حجم GM در بیماران بیش فعال مونث نسبت به هموعان سالم در ناحیه قشر کمر بندی قدامی شکمی
مونتیس و همکاران [۵۸]	مقایسه تراکم GM در ناحیه مخچه بین سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دختر بیش فعال از نوع ترکیبی غیر سفید پوست و افراد سالم	استفاده از روش VBM	MRI بیش فعال ترکیبی (دختر/ پسر) سالم (دختر/ پسر) رنج سنی: کودکان: ۶-۱۰ سال نوجوانان: ۱۴-۱۷ سال بزرگسالان: ۲۵-۳۵ سال	- کاهش حجم GM در ناحیه مخچه سمت راستی در بیماران بیش فعال دختر از نوع ترکیبی در هر سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان - درگیری ناحیه مخچه راست در بیماران بیش فعال دختر از سنین کودکی تا بزرگسالی
جناتاس و همکاران [۵۹]	بررسی تغییرات غلظت GM در کودکان مبتلا به بیش فعالی و اختلال همزمان عملکرد پردازش حسی (SPD)	استفاده از الگوریتم بخش‌بندی یادگیری عمیق	MRI بیش فعال + اختلال SPD (۲۵ پسر/ ۹ دختر) اختلال SPD (۳۲ پسر/ ۱۳ دختر) سالم (دختر/ پسر) رنج سنی: ۶-۱۷ سال	- کاهش تراکم GM در نواحی نئوکورتکس ^{۳۵} ، قشر کناره‌ای ^{۳۶} و مخچه در بیماران بیش فعال پسر دارای اختلال همزمان SPD
کوئی و همکاران [۶۰]	بررسی ارتباط بین تغییرات در علایم بیماری بیش فعالی، عملکردهای اجرایی ^{۳۷} و افسردگی در پسران و دختران مبتلا به ADHD طی یک دوره ۲ ساله	استفاده از ارزیابی‌های رفتاری، فردی و گزارش‌های والدین بیمار در رابطه با علایم بیش فعالی، عملکردهای اجرایی و افسردگی در دختران و پسران مبتلا به ADHD	۶۸ پسر (۳۹ بیش فعال/ ۲۹ سالم) ۵۴ دختر (۳۶ بیش فعال/ ۱۸ سالم) رنج سنی: ۹-۱۶ سال	- کاهش علایم بی‌توجهی در دختران بیش فعال با علایم افسردگی توسط گزارش‌های والدین بیمار - کاهش علایم تحرک بیش از حد در پسران بیش فعال با کاهش علایم افسردگی توسط ارزیابی‌ها از خود بیمار
لویو و همکاران [۶۱]	بررسی روابط متقابل بین عوامل ژنتیکی نظیر جنسیت، تغییرات حجم GM در بیماران بیش فعال مذکر و مونث	استفاده از آنالیز رگرسیون خطی جهت بررسی تأثیر کووریت‌های مختلف	MRI بیش فعال (دختر/ پسر) سالم (دختر/ پسر) رنج سنی: ۶-۱۸ سال	- کاهش حجم GM در بیماران بیش فعال مذکر در ناحیه پوتامن - کاهش حجم GM در بیماران بیش فعال مونث در نواحی پالیدوم و پوتامن چپی

مراجع

- [1] A. Bikic, J. F. Leckman, J. Lindschou, T. Ø. Christensen, and S. Dalsgaard, "Cognitive computer training in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) versus no intervention: study protocol for a randomized controlled trial", *Trials*, vol. 16, pp. 1-13, 2015.
- [2] A. E. Vierhile, D. Palumbo, and H. Belden, "Diagnosis and treatment of attention deficit hyperactivity disorder", *The Nurse Practitioner*, vol. 42, no. 10, pp. 48-54, 2017.
- [3] I. W. Hwang, B. N. Kwon, H. J. Kim, S. H. Han, N. R. Lee, M. H. Lim, and et al., "Assessment of associations between mitochondrial DNA haplogroups and attention deficit and hyperactivity disorder in Korean children", *Mitochondrion*, vol. 47, pp. 174-178, 2019.
- [4] F. Mowlem, J. Agnew-Blais, E. Taylor, and P. Asherson, "Do different factors influence whether girls versus boys meet ADHD diagnostic criteria? Sex differences among children with high ADHD symptoms", *Psychiatry research*, vol. 272, pp. 765-773, 2019.
- [5] U. Klefsjö, A. K. Kantzer, C. Gillberg, and E. Billstedt, "The road to diagnosis and treatment in girls and boys with ADHD—gender differences in the diagnostic process", *Nordic journal of psychiatry*, vol. 75, no. 4, pp. 301-305, 2021.
- [6] A. S. Bell, "A critical review of ADHD diagnostic criteria: What to address in the DSM-V", *Journal of Attention Disorders*, vol. 15, no. 1, pp. 3-10, 2011.
- [7] C. Sridhar, S. Bhat, U. R. Acharya, H. Adeli, and G. M. Bairy, "Diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder using imaging

³¹ Supplementary Motor Complex

³² Lateral premotor cortex

³³ Accumbens

³⁴ Globus pallidus

³⁵ Neocortex

³⁶ Limbic cortex

³⁷ Executive Function

- [23] A. Hutchinson, J. Mathias, and M. Banich, "Corpus callosum morphology in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analytic review", *Neuropsychology*, vol. 22, no. 3, p. 341, 2008.
- [24] C. Gaser, R. Dahnke, P. M. Thompson, F. Kurth, E. Luders, and A. S. D. N. Initiative, "CAT—A computational anatomy toolbox for the analysis of structural MRI data", *bioRxiv*, p. 2022.06. 11.495736, 2022.
- [25] J. Ashburner, G. Barnes, C. C. Chen, J. Daunizeau, G. Flandin, K. Friston, and et al., "SPM12 manual", Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, London, UK, vol. 2464, no. 4, 2014.
- [26] F. Farokhian, I. Beheshti, D. Sone, and H. Matsuda, "Comparing CAT12 and VBM8 for detecting brain morphological abnormalities in temporal lobe epilepsy", *Frontiers in neurology*, 8: p. 428, 2017.
- [27] S. Etemadi, M. Saadatmand-Tarzjan, M. Shamirzaei, and J. Khosravi, "An efficient 3D gradient-based algorithm for medical image registration using correlation-coefficient maximization", in 2014 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), pp. 663-668: IEEE, 2014.
- [28] E. T. Rolls, C.-C. Huang, C.-P. Lin, J. Feng, and M. Joliet, "Automated anatomical labelling atlas 3", *Neuroimage*, vol. 206, p. 116189, 2020.
- [29] P. Bellec, C. Chu, F. Chouinard-Decorte, Y. Benhajali, D. S. Margulies, and R. C. Craddock, "The neuro bureau ADHD-200 preprocessed repository", *Neuroimage*, vol. 144, pp. 275-286, 2017.
- [30] S. Carmona, O. Vilarroya, A. Bielsa, V. Trèmols, J.C. Soliva, M. Rovira, and et al., "Global and regional gray matter reductions in ADHD: a voxel-based morphometric study", *Neuroscience letters*, vol. 389, no. 2, pp. 88-93, 2005.
- [31] K. Nickel, L. T. v. Elst, J. Manko, J. Unterrainer, R. Rauh, C. Klein, D. Endres, and et al., "Inferior frontal gyrus volume loss distinguishes between autism and (comorbid) attention-deficit/hyperactivity disorder—a FreeSurfer analysis in children", *Frontiers in psychiatry*, vol. 9, p. 521, 2018.
- [32] T. Nakao, J. Radua, K. Rubia, and D. Mataix-Cols, "Gray matter volume abnormalities in ADHD: voxel-based meta-analysis exploring the effects of age and stimulant medication", *American Journal of Psychiatry*, vol. 168, no. 11, pp. 1154-1163, 2011.
- [33] M. Haddadpour, F. Wallois, and M. Saadatmand, "Statistical analysis of brain volume changes in T1-weighted magnetic resonance images of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) based on voxel-based morphometry", in 2020 8th Iranian Joint Congress on Fuzzy and intelligent Systems (CFIS), pp. 93-98: IEEE, 2020.
- [34] O. Gonchigsuren, M. Harada, S. Hisaoka, K. Higashi, Y. Matsumoto, N. Sumida, and et al., "Brain abnormalities in children with attention-deficit/hyperactivity disorder assessed by multi-delay arterial spin labeling perfusion and voxel-based morphometry", *Japanese Journal of Radiology*, vol. 40, no. 6, pp. 568-577, 2022.
- [35] H. Y. Seok and D. H. Lee, "Magnetic resonance imaging of idiopathic herniation of the lingual gyrus: A case report", *Investigative Magnetic Resonance Imaging*, vol. 21, no. 3, pp. 195-198, 2017.
- [36] R. Leech and D. J. Sharp, "The role of the posterior cingulate cortex in cognition and disease", *Brain*, vol. 137, no. 1, pp. 12-32, 2014.
- [37] N. B. Dadario and M. E. Sughrue, "The functional role of the precuneus", *Brain*, vol. 146, no. 9, pp. 3598-3607, 2023.
- [38] Y. Wang, Q. Xu, S. Li, G. Li, C. Zuo, S. Liao, and et al., "Gender differences in anomalous subcortical morphology for children with ADHD", *Neuroscience letters*, vol. 665, pp. 176-181, 2018.
- [39] K. A. Kovács, "Episodic memories: how do the hippocampus and the entorhinal ring attractors cooperate to create them?," *Frontiers in systems neuroscience*, vol. 14, p. 559168, 2020.
- [40] J. Pearson, "The human imagination: the cognitive neuroscience of visual mental imagery," *Nature reviews neuroscience*, vol. 20, no. 10, pp. 624-634, 2019.
- and signal processing techniques", *Computers in Biology and Medicine*, vol. 88, pp. 93-99, 2017.
- [8] فریما مقدم، پیوند قادریان، موسی شمسی، «تشخیص بیماری نقص توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب‌خوردگی زمانی پویا»، *مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز*، صفحات ۲۲۳-۲۳۳، ۱۴۰۲.
- [9] سید هانی حجتی، عطاله ابراهیم زاده، علی خزائی، عباس باباجانی فرمی، «پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی‌های محاسبات نرم و برایه rs-fMRI و sMRI»، *مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز*، صفحات ۵۵۱-۵۶۳، ۱۳۹۸.
- [10] C. Scarpazza and M. Stefania De Simone, "Voxel-based morphometry: current perspectives", *Neuroscience and Neuroeconomics*, pp. 19-35, 2016.
- [11] V. Vilgis, L. Sun, J. Chen, T. J. Silk, and A. Vance, "Global and local grey matter reductions in boys with ADHD combined type and ADHD inattentive type", *Psychiatry Research: Neuroimaging*, vol. 254, pp. 119-126, 2016.
- [12] B. Bonath, J. Tegelbeckers, M. Wilke, H.-H. Flechtner, and K. Krauel, "Regional gray matter volume differences between adolescents with ADHD and typically developing controls: further evidence for anterior cingulate involvement", *Journal of attention disorders*, vol. 22, no. 7, pp. 627-638, 2018.
- [13] U. P. Ramtekkar, A. M. Reiersen, A. A. Todorov, and R. D. Todd, "Sex and age differences in attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and diagnoses: implications for DSM-V and ICD-11", *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 49, no. 3, pp. 217-228. e3, 2010.
- [14] G. H. Gudjonsson, J. F. Sigurdsson, I. D. Sigfusdottir, and S. Young, "A national epidemiological study of offending and its relationship with ADHD symptoms and associated risk factors", *Journal of attention disorders*, vol. 18, no. 1, pp. 3-13, 2014.
- [15] L.-J. Wang, S.-Y. Lee, S.-S. Yuan, C.-J. Yang, K.-C. Yang, T.-S. Huang, and et al., "Prevalence rates of youths diagnosed with and medicated for ADHD in a nationwide survey in Taiwan from 2000 to 2011", *Epidemiology and psychiatric sciences*, vol. 26, no. 6, pp. 624-634, 2017.
- [16] O. Slobodin and M. Davidovitch, "Gender differences in objective and subjective measures of ADHD among clinic-referred children", *Frontiers in human neuroscience*, vol. 13, p. 441, 2019.
- [17] P. Quinn, 100 Questions & Answers About Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Women and Girls. Jones & Bartlett Learning, 2010.
- [18] K. Bruchmüller, J. Margraf, and S. Schneider, "Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria? Overdiagnosis and influence of client gender on diagnosis", *Journal of consulting and clinical psychology*, vol. 80, no. 1, p. 128, 2012.
- [19] K. E. Seymour, X. Tang, D. Crocetti, S. H. Mostofsky, M. I. Miller, and K. S. Rosch, "Anomalous subcortical morphology in boys, but not girls, with ADHD compared to typically developing controls and correlates with emotion dysregulation", *Psychiatry Research: Neuroimaging*, vol. 261, pp. 20-28, 2017.
- [20] A. M. H. Onnink, M. P. Zwiers, M. Hoogman, J. C. Mostert, C. C. Kan and J. Buitelaar et al., "Brain alterations in adult ADHD: effects of gender, treatment and comorbid depression", *European Neuropsychopharmacology*, vol. 24, no. 3, pp. 397-409, 2014.
- [21] K. S. Rosch, D. Crocetti, K. Hirabayashi, M. B. Denckla, S. H. Mostofsky, and E. M. Mahone, "Reduced subcortical volumes among preschool-age girls and boys with ADHD", *Psychiatry Research: Neuroimaging*, vol. 271, pp. 67-74, 2018.
- [22] L. Lu, Z. Lianqing, T. Shi, B. Xuan, C. Ying, H. Xinyu, and et al., "Characterization of cortical and subcortical abnormalities in drug-naive boys with attention-deficit/hyperactivity disorder", *Journal of affective disorders*, vol. 250, pp. 397-403, 2019.

- Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 108, no. 38, pp. 16068-16073, 2011.
- [53] A. Wyciszkievicz, M. A. Pawlak, and K. Krawiec, "Cerebellar volume in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) replication study", *Journal of child neurology*, vol. 32, no. 2, pp. 215-221, 2017.
- [54] L. Fernandez, A. Burmester, J. D. Duque, T. J. Silk, C. E. Hyde, M. Kirkovski, and et al., "Examination of cerebellar grey-matter volume in children with neurodevelopmental disorders: a coordinated analysis using the ACAPULCO algorithm", *The Cerebellum*, vol. 22, no. 6, pp. 1243-1249, 2023.
- [55] L. C. Rice, R. N. Rochowiak, M. R. Plotkin, K. S. Rosch, S. H. Mostofsky, and D. Crocetti, "Sex Differences and Behavioral Associations with Typically Developing Pediatric Regional Cerebellar Gray Matter Volume", *The Cerebellum*, pp. 1-12, 2023.
- [56] E. M. Mahone, M. E. Ranta, D. Crocetti, J. O'Brien, W. E. Kaufmann, M. B. Denckla, and S. H. Mostofsky, "Comprehensive examination of frontal regions in boys and girls with attention-deficit/hyperactivity disorder", *Journal of the International Neuropsychological Society*, 17(6): p. 1047-1057, 2011.
- [57] T. Villemonteix, S. A. De Brito, H. Slama, M. Kavec, D. Balériaux, T. Metens, and et al., "Grey matter volume differences associated with gender in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a voxel-based morphometry study", *Developmental cognitive neuroscience*, 32-37, 2015.
- [58] L. G. A. Montes, J. Ricardo-Garcell, L. De La Torre, H. P. Alcántara, R. B. Martínez García, D. Ávila Acosta, and A. Fernández Bouzas, "Cerebellar gray matter density in females with ADHD combined type: a cross-sectional voxel-based morphometry study. *Journal of attention disorders*", 15(5): p. 368-381, 2011.
- [59] E. D. Gennatas, J. Wren-Jarvis, R. Powers, M. C. Lazerwitz, I. Bourla, L. T. Cai, and et al., "Gray matter correlates of attention-deficit hyperactivity disorder in boys versus girls with sensory processing dysfunction", *Imaging Neuroscience*, 2, 1-14, 2024.
- [60] M. Øie, K. T. Hovik, P. N. Andersen, N. O. Czajkowski, and E. W. Skogli, "Gender differences in the relationship between changes in ADHD symptoms, executive functions, and self-and parent-report depression symptoms in boys and girls with ADHD: A 2-year follow-up study", *Journal of attention disorders*, 22(5): p. 446-459, 2018.
- [61] X. Luo, W. Fang, X. Guo, Y. Chen, Y. Tan, L. Wang, and et al., "Sex-different interrelationships of rs945270, cerebral gray matter volumes, and attention deficit hyperactivity disorder: a region-wide study across brain", *Translational Psychiatry*, 12(1): p. 225, 2022.
- [41] T. Bailey and A. Joyce, "The role of the thalamus in ADHD symptomatology and treatment," *Applied Neuropsychology: Child*, vol. 4, no. 2, pp. 89-96, 2015.
- [42] S. M. Sherman, "Thalamus," *Scholarpedia*, vol. 1, no. 9, p. 1583, 2006.
- [43] J. V. M. Gordana Sendić. (November 03, 2023). Thalamus nuclei. Available: <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/thalamic-nuclei>
- [44] C. Fu, S. Chen, A. Qian, R. Zhou, J. Zhou, J. Li, and et al., "Larger thalamus correlated with inattentive severity in the inattentive subtype of ADHD without comorbidity", *Psychiatry Research*, vol. 304, p. 114079, 2021.
- [45] I. Ivanov, R. Bansal, X. Hao, H. Zhu, C. Kellendonk, L. Miller, and et al., "Morphological abnormalities of the thalamus in youths with attention deficit hyperactivity disorder", *American Journal of Psychiatry*, vol. 167, no. 4, pp. 397-408, 2010.
- [46] M. J. Batty, L. Palaniyappan, G. Scerif, M. J. Groom, E. B. Liddle, P. F. Liddle, and et al., "Morphological abnormalities in prefrontal surface area and thalamic volume in attention deficit/hyperactivity disorder", *Psychiatry Research: Neuroimaging*, vol. 233, no. 2, pp. 225-232, 2015.
- [47] H. Li, Q. Yuan, Y.-J. Luo, and W. Tao, "A new perspective for understanding the contributions of the cerebellum to reading: the cerebro-cerebellar mapping hypothesis", *Neuropsychologia*, vol. 170, p. 108231, 2022.
- [48] M. M. Bruchhage, M.-P. Bucci, and E. B. Becker, "Cerebellar involvement in autism and ADHD", *Handbook of clinical neurology*, vol. 155, pp. 61-72, 2018.
- [49] O. Baumann, R. Borra, J. M. Bower, K. E. Cullen, C. Habas, R. B. Ivry, and et al., "Consensus paper: the role of the cerebellum in perceptual processes", *The Cerebellum*, vol. 14, pp. 197-220, 2015.
- [50] C. Clinic. ADHD in Women: Symptoms, Diagnosis & Treatment. Available: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24741-adhd-in-women>.
- [51] V. U. Vildalen, E. J. Brevik, J. Haavik, and A. J. Lundervold, "Females with ADHD report more severe symptoms than males on the adult ADHD self-report scale", *Journal of attention disorders*, vol. 23, no. 9, pp. 959-967, 2019.
- [52] K. A. Coffman, R. P. Dum, and P. L. Strick, "Cerebellar vermis is a target of projections from the motor areas in the cerebral cortex",