

اثر قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد توده‌های محلی کنجد (*Sesamum indicum* L.) در سطوح مختلف آبیاری

اسماعیل قلی نژاد^{1*}، رضا درویش زاده²

تاریخ دریافت: 94/5/24 تاریخ پذیرش: 94/8/20

1- استادیار گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2- دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

*مسئول مکاتبه: E-mail: gholinezhad1358@yahoo.com

چکیده

به منظور بررسی اثرات دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه 8 توده محلی کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل - اسپلیت پلات با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه واقع در 12 کیلومتری شهرستان ارومیه اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری (آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلیمتر تبخیر و تعرق گیاه یا ETC، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلیمتر ETC و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلیمتر ETC)، فاکتور فرعی شامل عدم تلقیح و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزای *Glomus intraradices* و *Glomus mosseae*، فاکتور فرعی شامل 8 توده محلی کنجد (جیرفت 13، محلی طارم زنجان، محلی مغان، ناز چند شاخه، TC-25، TS-3، داراب 14 و دشتستان 5) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر سطوح مختلف آبیاری، میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات مورد مطالعه معنی‌دار است. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی، عملکرد دانه، تعداد کپسول در هر بوته، تعداد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در هر کپسول و عملکرد بیولوژیک به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. تنش شدید خشکی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب به میزان 63 و 52 درصد کاهش داد. استفاده از دو گونه قارچ میکوریزا نسبت به حالت عدم استفاده از قارچ باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه شد. در بین توده‌های محلی کنجد مورد بررسی، ژنوتیپ‌های محلی مغان و محلی طارم زنجان از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هر سه شرایط مختلف آبیاری، برتر از سایر توده‌ها بودند. این توده‌ها می‌توانند به عنوان توده‌های محلی برتر معرفی گردند. با توجه به نتایج این تحقیق، جهت بهبود عملکرد و اجزای عملکرد دانه استفاده از قارچ‌های میکوریزا به خصوص گونه *G.mosseae* قابل توصیه است.

واژه‌های کلیدی: تنش خشکی، توده‌های محلی، عملکرد دانه، قارچ میکوریزا، کنجد

Effect of Mycorrhizal Fungi on Yield and Yield Components of Sesame (*Sesamum indicum* L.) landraces Under Different Irrigation levels

Esmail Gholinezhad^{1*}, Reza Darvishzadeh²

Received: August 15, 2015 Accepted: November 11, 2015

1 Assist. Prof., Dept. of Agronomy, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assoc. Prof., Dept. of Plant Breeding and Biotechnology, Urmia University, Urmia, Iran.

*Corresponding Author: gholinezhad1358@yahoo.com

Abstract

In order to investigate the effects of different levels of drought stress and two kinds of mycorrhizal fungi on yield and yield components of eight sesame (*Sesamum indicum* L.) landraces, an experimental using factorial split plot design was conducted with three replications in research field of Urmia agricultural high school. The main factor was consisted different levels of irrigation, normal irrigation (irrigation after 70 mm evaporation of crop (ETc)), moderate drought stress (irrigation after 90 mm ETc) and severe drought stress (irrigation after 110 mm ETc), sub plots including two kinds of mycorrhizal fungi *Glomus mosseae*, *Glomus intraradices* and non-inoculated (control). Sub-sub plots consisted of eight landraces of sesame names Jiroft13, Zanjan Tarom landrace, Moghan landrace, several branches Naz, TC-25, TS-3, Darab 14 and Dashtestan 5. Results of analysis showed that the effect of different levels of irrigation, mycorrhizal fungi and genotypes on studied traits was significant. Mean comparison showed that with increasing severity of drought stress, grain yield, capsule no per plant, grains no per area, grains no per capsule and biological yield decreased significantly. Severe drought stress reduced grain yield and biological yield about 63 and 52 percent, respectively. Using two kinds of mycorrhizal fungi *Glomus mosseae*, *Glomus intraradices* in compared with non-inoculated (control) all traits such as yield and yield components increased. Among under studied sesame landraces, Moghan landrace and Zanjan Tarom landrace based on traits yield and yield components had superiority on other landraces. For improvement yield and yield components, using mycorrhizal fungi, especially *G.mosseae* is recommendable. Also in three different irrigation conditions, Moghan landrace and Zanjan Tarom landrace were superior landraces.

Keywords: Drought Stress, Grain Yield, Landraces, Mycorrhizal Fungi, Sesame

مقدمه

تنش خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده تولید محصول در بسیاری از مناطق دنیا است (پاسیورا 2007). کنجد (*Sesamum indicum* L.) گیاهی یک ساله، از قدیمی ترین گیاهان دانه روغنی سازگار با نواحی گرم و نیمه گرم است، ولی تولید ارقام مناسب موجب گردیده که کشت آن در مناطق دیگر نیز گسترش یابد (وئیس 2000). در نواحی خشک و نیمه خشک کشور کنجد به عنوان یک گیاه اقتصادی و به صورت آبی و معمولاً در تناوب با گندم کشت می‌گردد (سپاسخواه و اندام 2001). تولید کنجد در استان‌های خوزستان، بلوچستان، اصفهان و فارس و حتی نواحی سرد مانند شهرهای اراک، نهاوند و مراغه بیشتر مورد توجه است (خواجه پور 1377). سطح زیر کشت کنجد در جهان حدود 7897048 هکتار و تولید آن حدود 4036289 تن با متوسط عملکرد 511 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. در ایران سطح زیر کشت کنجد حدود 40000 هکتار و تولید آن حدود 28000 تن با متوسط عملکرد 700 کیلوگرم در هکتار می‌باشد (فائو 2012). با توجه به وجود اراضی مساعد تولید، تجربه زراعی دراز مدت در کشاورزی و تقاضای زیاد برای روغن با کیفیت بالا، امروزه زراعت کنجد حایز اهمیت و مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت دارد علاوه بر افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی، جهت حصول حداکثر عملکرد بهترین شرایط محیطی و مناسب ترین رقم برای هر منطقه از طریق اجرای طرح‌های به نژادی و به زراعی شناسایی و تعیین گردد. سعیدی و همکاران (2012) گزارش کردند با افزایش تنش خشکی، عملکرد دانه کنجد کاهش می‌یابد. ایشان بیشترین عملکرد بیولوژیک را از دور آبیاری 5 روز و از ژنوتیپ J113 گزارش کردند. در آزمایش آنها بیشترین تعداد دانه در کپسول و بیشترین تعداد کپسول در گیاه در ژنوتیپ داراب 14 و سیرجان مشاهده شد. بسیاری از گزارشات نشان داده است که تنش خشکی تاثیرات نامطلوبی بر رشد و نمو گیاهان می‌گذارد (بهرامی و همکاران 2012، بور و همکاران

2009، بویریما و همکاران 2007، امانی و همکاران 2012، حسن زاده و همکاران 2009، اوررانو و مورگان 2007، تورک و همکاران 2004). فواصل طولانی آبیاری باعث کاهش رشد، کاهش عملکرد دانه کنجد به دلیل تاثیر بر مراحل مختلف فتوسنتز، می‌شود (ال - پالسان و همکاران 2001، منساه و همکاران 2006). حیدری و همکاران (2011) نشان دادند که بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب حاصل می‌شود.

میکوریزا از با اهمیت‌ترین قارچ‌های موجود در اغلب خاک‌های تخریب نشده است. برآورد می‌شود در حدود 70 درصد از توده زنده جامعه میکروبی خاک را میسیلیوم این قارچ‌ها تشکیل می‌دهند. اصطلاح میکوریزا از دو کلمه *Mykes* به معنی قارچ و دیگری کلمه‌ی *Rhiza* به معنی ریشه تشکیل شده است (رجالی و همکاران 1386). در همزیستی قارچ‌های میکوریزا با گیاه میزبان، قسمتی از کربن حاصل از فتوسنتز گیاه در اختیار قارچ همزیست قرار می‌گیرد و در ازای آن شبکه گسترده هیف قارچ‌های میکوریزا، جذب و انتقال آب و عناصر معدنی را از مناطقی که برای سیستم ریشه‌ای غیر قابل دسترس می‌باشد به گیاه تسریع کرده و کمک می‌کند تا گیاهان قادر به رشد در شرایط دشوار باشند (آمرین و همکاران 2001). چو و همکاران (2006) در طی آزمایشی دریافتند همزیستی سورگوم با قارچ‌های میکوریزا تحت شرایط تنش خشکی و شوری مقاومت آن را به تنش‌ها افزایش می‌دهد. نتایج تحقیقی روی گیاه گشنیز نشان داد که قارچ میکوریزا، سبب افزایش عملکرد بیولوژیک در گیاه گشنیز گردیده و درصد اسانس را آن را افزایش می‌دهد و به این ترتیب عملکرد اسانس افزایش می‌یابد (کپور و همکاران 2001). رحیمی و همکاران (1388) گزارش کردند که با استفاده از همزیستی میکوریزایی در گیاه سورگوم می‌توان بخشی از کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی را جبران نمود. جمشیدی و همکاران (1388) نشان دادند که قارچ *G. mosseae* دارای قدرت همزیستی بیشتری در مقایسه با قارچ *G. hoi* در گیاه آفتابگردان می‌باشد. باقری و

ارومیه - مهاباد اجرا گردید. طول جغرافیایی محل آزمایش 45 درجه و 2 دقیقه و عرض جغرافیایی آن 37 درجه و 32 دقیقه و ارتفاع از سطح دریا 1332 متر می-باشد. براساس آمار هواشناسی، منطقه با داشتن 150 تا 180 روز خشک، زمستان‌های سرد و مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک جزء رژیم رطوبتی خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود. فاکتور اصلی سطوح مختلف آب شامل آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلیمتر ETC، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلیمتر ETC و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلیمتر ETC، فاکتور فرعی شامل دو گونه قارچ میکوریزا *Glomus mosseae*، *Glomus intraradices* (در تیمارهای مربوطه در هر چاله 10 گرم قارچ ریخته شده سپس روی قارچ با خاک به اندازه دو سانتیمتر پوشش داده شده و بذرها روی خاک کاشته شدند و مجدداً روی بذرها حدود سه سانتیمتر با خاک پوشانده شد) و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و فاکتور فرعی شامل 8 توده محلی کنجد به نام‌های جیرفت 13، محلی طارم زنجان، محلی مغان، ناز چند شاخه، TC-25، TS-3، داراب 14 و دشتستان 5 بود. بذر توده‌ها در 5 و 6 خرداد ماه سال 1393 با فاصله ردیف 50 و فاصله بوته 15 سانتیمتر کشت شدند. هر کرت دارای 6 خط کاشت به طول 6 متر بود. کاشت به صورت جوی و پشته و آبیاری به روش نشتی انجام گرفت. در موقع کاشت در هر کپه 3 عدد بذر قرار داده شد که بعداً در مرحله 2-4 برگی بوته‌های اضافی تنک شدند. تا مرحله 2-4 برگی و استقرار کامل گیاه همه تیمارها به طور یکسان آبیاری شدند و بعد از این مرحله سطوح مختلف تنش خشکی اعمال شد.

همکاران (1390) نشان دادند که همزیستی میکوریزایی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد رویشی گیاه پسته را در شرایط تنش خشکی افزایش می‌دهد به طوری که *G. intraradices* و *mosseae* به ترتیب 100 و 70 درصد ارتفاع بوته را نسبت به شاهد افزایش دادند. علی آبادی و همکاران (1387) اعلام کردند که قارچ میکوریزا صفات کمی و کیفی گشنیز را افزایش می‌دهد. نادیان (1390) نشان داد که در تمام سطوح تنش خشکی، وزن ماده خشک سورگوم میکوریزایی از ارقام شاهد بیشتر است. حقیقت نیا و همکاران (1391) اعلام کردند که کلنی سازی میکوریزایی به ویژه توسط گونه *G. mosseae* سبب بهبود مقاومت به تنش خشکی و جبران بخشی از کاهش عملکرد می‌شود. علی رغم تحقیقات گسترده‌ای که در مورد همزیستی قارچ‌های میکوریزایی با گیاهان مختلف زراعی صورت گرفته (سلیمان زاده 2010)، هنوز اطلاعات محدودی در رابطه با همزیستی گیاه کنجد با این قارچ‌ها در شرایط تنش خشکی وجود دارد. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر همزیستی دو گونه مختلف از قارچ‌های میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه توده‌های محلی مختلف کنجد تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی در ارومیه انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی اثرات دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه 8 توده محلی کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل - اسپلیت پلات با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه واقع در 12 کیلومتری جاده

جدول 1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

عمق خاک (cm)	بافت خاک	EC (dS/m)	pH	درصد مواد خنثی شونده	رطوبت اشباع (%)	آهک (%)	رس (%)	سیلت (%)	شن (%)	کربن آلی (%)	نیترژن (%)	فسفر (میلی‌گرم در کیلوگرم)	پتاسیم (میلی‌گرم در کیلوگرم)
0-30	لومی - لومی رسی	0/77	7/69	22/8	30	-	38	36	26	1/11	0/11	5/21	221

جدول 2- مقادیر متوسط ماهانه دما، بارش، تبخیر و رطوبت هوا در طی فصل رشد کنجد در منطقه مورد مطالعه

پارامترهای هواشناسی	ماه				
	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور
حداکثر دما (درجه سلسیوس)	24/1	27/8	32/7	33/2	31/4
حداقل دما (درجه سلسیوس)	9/2	11/0	15/8	15/7	12/6
میانگین دما (درجه سلسیوس)	16/6	19/4	24/5	24/4	22/0
مجموع بارندگی (میلی‌متر)	35/1	24/1	0/0	0/0	0/1
کل تبخیر (میلی‌متر)	190/3	255/9	238/0	281/8	236/7
میانگین رطوبت نسبی (%)	53	51	44	42	43

70، 90 و 110 میلیمتر بدست آمد که معادل تبخیر و تعرق گیاه یا ET_c در نظر گرفته شد.

$$ET_o = ET_p \times K_p$$

$$ET_c = ET_o \times K_c$$

در این فرمول ها ET_o = تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه، ET_p = تبخیر و تعرق تشتک تبخیر، ET_c = تبخیر و تعرق گیاه، K_c = ضریب گیاهی کنجد، K_p = ضریب تشتک تبخیر می‌باشند.

صفات زیر در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند: تعداد کپسول در بوته (از هر تیمار 5 بوته انتخاب و میانگین گرفته شد)، تعداد دانه در کپسول (از هر تیمار 5 کپسول انتخاب و میانگین گرفته شد)، تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار دانه (4 تکرار 100 تایی جداگانه وزن گردید و میانگین گرفته شد)، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک (از خطوط وسط به مساحت 2 مترمربع توزین شد)، شاخص برداشت (عملکرد دانه در 100 ضرب شده و سپس بر عملکرد بیولوژیک تقسیم گردید). برای داده‌هایی که از طریق شمارش بدست آمده بودند (مانند تعداد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در هر کپسول و تعداد کپسول در هر بوته) تبدیل جذری اعمال شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS، MSTATC و رسم نمودارها

مقدار آب سهل الوصول در هریک از تیمارهای آزمایشی از طریق فرمول زیر محاسبه شد.

$$RAW = \frac{FC - PWP}{100} \times \rho \times D \times MAD$$

در این فرمول RAW = آب سهل الوصول (میلی متر)، FC = ظرفیت زراعی، PWP = نقطه پژمردگی دایم، ρ = وزن مخصوص ظاهری D = عمق توسعه ریشه بر حسب میلیمتر، MAD = ضریب آب سهل الوصول می‌باشد. ضریب آب سهل الوصول با F یا θ نیز نشان داده می‌شود. MAD = ضریب آب سهل الوصول همان آب قابل استفاده است که بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم قرار گرفته است. این ضریب در آبیاری مطلوب 0/65 در تنش ملایم 0/8 و در تنش شدید 0/95 در نظر گرفته شد. با توجه به نوع خاک که لومی رسی بود ظرفیت زراعی خاک 27، نقطه پژمردگی دایم 13 و وزن مخصوص ظاهری خاک 1/35 در نظر گرفته شد. عمق توسعه ریشه در کنجد 600 میلی متر در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه مقدار آب سهل الوصول (میلی متر) در شرایط آبیاری نرمال برابر بود با:

$$RAW = \frac{27 - 13}{100} \times 1.35 \times 600 \times 0.65$$

در شرایط آبیاری مطلوب، تنش ملایم و تنش شدید خشکی آب سهل الوصول یا RAW به ترتیب برابر

بوته در تلقیح با قارچ *G. mosseae* مشاهده شد. ساینز و همکاران (1998) بیان کردند که قارچ‌های میکوریزا از طریق افزایش جذب عناصر غذایی مانند فسفر، نیتروژن و عناصر ریزمغذی، افزایش جذب آب، افزایش مقاومت در برابر تنش‌های زنده و غیر زنده، سبب بهبود رشد و اجزای عملکرد گیاه میزبان می‌شوند. سعیدی و همکاران (2012) در بررسی روی کنجد بیشترین تعداد کپسول در هر بوته را در ژنوتیپ سیرجان با دور آبیاری 7 روز گزارش کردند در حالی که کمترین تعداد کپسول در هر بوته در ژنوتیپ‌های گرگان و بیرجند با دوره‌های آبیاری 7 روز مشاهده شد.

وزن هزار دانه

نتایج مقایسه میانگین اثرات سه گانه نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی، وزن 1000 دانه به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. تنش خشکی شدید و ملایم در مقایسه با آبیاری مطلوب، وزن 1000 دانه را به ترتیب به میزان 30 و 15 درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد کاهش وزن هزار دانه در شرایط تنش خشکی به علت کوتاه شدن دوره پر شدن دانه و پیری زودرس باشد. با تلقیح با قارچ میکوریزا در شرایط تنش خشکی شدید، کاهش وزن 1000 دانه تا حدودی جبران گردید به طوری که مصرف قارچ‌های *G. mosseae* و *G. intraradices* در مقایسه با عدم تلقیح، وزن 1000 دانه را به ترتیب 13 و 7 درصد بهبود بخشید (جدول 8). در شرایط تنش خشکی ملایم نیز تلقیح با قارچ‌های *G. intraradices* و *G. mosseae* در مقایسه با عدم تلقیح، وزن 1000 دانه را به ترتیب 10 و 7 درصد بهبود بخشید (جدول 7). در شرایط آبیاری مطلوب تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* نسبت به عدم تلقیح، وزن 1000 دانه را حدود 7 درصد افزایش داد (جدول 7). به نظر می‌رسد تلقیح با قارچ میکوریزا هرچند در هر سه شرایط مختلف آبیاری، وزن 1000 دانه را افزایش داده ولی در شرایط تنش خشکی شدید تلقیح موثرتر

با استفاده از Excel انجام و مقایسه میانگین‌ها نیز توسط آزمون توکی در سطح 5 درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس صفات

نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر اثرات ساده آبیاری، میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات تعداد کپسول در هر بوته، وزن 1000 دانه، تعداد دانه در هر کپسول، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در واحد سطح معنی‌دار است. اثرات بر همکنش آبیاری × میکوریزا فقط بر صفت تعداد دانه در هر کپسول معنی‌دار بود. اثرات بر همکنش آبیاری × ژنوتیپ بر صفات وزن 1000 دانه، تعداد دانه در هر کپسول، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی‌دار بود. اثرات بر همکنش میکوریزا × ژنوتیپ فقط بر صفت عملکرد بیولوژیک معنی‌دار بود. اثرات بر همکنش سه گانه آبیاری × میکوریزا × ژنوتیپ فقط بر صفت وزن 1000 دانه معنی‌دار بود (جدول 3).

تعداد کپسول در هر بوته

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی از تعداد کپسول در هر بوته کاسته شد به طوری که بیشترین و کمترین تعداد کپسول در هر بوته به ترتیب در تیمار آبیاری مطلوب (110/08) و تنش شدید خشکی (46/22) بدست آمد. در بین توده‌های محلی توده محلی مغان، بیشترین (128/73) و توده TS-3، کمترین (41/09) تعداد کپسول در هر بوته را تولید کردند (جدول 4). مهربانی و احسان زاده (1390) در بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک نشان دادند در شرایط تنش خشکی تعداد کپسول در هر بوته به میزان 42 درصد کاهش می‌یابد. در مطالعه ایشان کاربرد قارچ میکوریزا در کل باعث افزایش تعداد کپسول در هر بوته شد و بیشترین تعداد کپسول در هر

قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* نسبت به عدم مصرف قارچ میکوریزا، تعداد دانه در هر کپسول را به میزان 4 درصد افزایش داد در حالی که در شرایط تنش خشکی شدید و ملایم، تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* و گونه *G. intraradices* نسبت به عدم مصرف قارچ میکوریزا، تعداد دانه در هر کپسول را به ترتیب به میزان 13 و 5 درصد افزایش داد که نشان می‌دهد در شرایط محدودیت آب، تلقیح با قارچ میکوریزا تا حدودی اثرات نامطلوب کمبود آب را جبران می‌کند و از کاهش بیشتر تعداد دانه در هر کپسول جلوگیری می‌شود. راعی و همکاران (1394) در گیاه گلرنگ گزارش کردند که کاربرد میکوریزا باعث افزایش تعداد دانه در طبق می‌شود. توحیدی مقدم و همکاران (2004) گزارش کردند که حلالیت فسفر توسط میکوریزا و در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی ریشه به فسفر می‌تواند در افزایش تعداد دانه در گیاه و نیز سایر اجزای عملکرد گیاه سویا موثر باشد. بیشترین تعداد دانه در هر کپسول از توده محلی مغان (86/36) در شرایط آبیاری مطلوب و کمترین تعداد دانه در هر کپسول در توده محلی جیرفت 13 در شرایط تنش خشکی شدید مشاهده شد (جدول 6). بررسی میانگین تعداد دانه در هر کپسول نشان می‌دهد که تنش خشکی شدید در مقایسه با شرایط آبیاری مطلوب، تعداد دانه در هر کپسول را در توده محلی مغان و جیرفت 13 به ترتیب به میزان 28 و 44 درصد کاهش داده است (جدول 6).

عملکرد بیولوژیک

بر اساس نتایج مقایسه میانگین برهکنش آبیاری × ژنوتیپ، بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در توده محلی مغان در شرایط آبیاری مطلوب (1188/40) گرم بر مترمربع) و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در ژنوتیپ TS-3 در شرایط تنش خشکی شدید (136/91) گرم بر مترمربع) مشاهده شد. در شرایط تنش خشکی شدید، از نظر عملکرد بیولوژیک بین توده‌های جیرفت

بوده است. جمشیدی و همکاران (1388) بیان داشتند که کاربرد میکوریزا باعث افزایش وزن هزار دانه شده و از این طریق عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی و نرمال افزایش می‌یابد. بیشترین وزن 1000 دانه در توده‌های محلی مغان (3/8 گرم) و طارم زنجان (3/7 گرم) در شرایط آبیاری مطلوب و تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* مشاهده شد و کمترین مقدار وزن 1000 دانه در توده محلی TS-3 (1/6 گرم) در شرایط تنش خشکی شدید و عدم مصرف قارچ میکوریزا مشاهده شد. هرچند تحت شرایط تنش خشکی شدید بین توده‌های محلی جیرفت 13، ناز چند شاخه، TC-25، داراب 14 و دشتستان 5 با توده محلی TS-3 اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول 7). سعیدی و همکاران (2012) در بررسی ژنوتیپ‌های کنجد، Gorgan, Shiraz, Markaze, Birjand, Orzoieh, Sirjan, Ardestan, (Safe Abad, Yellow white, Darab 14, J113) مشاهده کردند که بیشترین و کمترین مقدار وزن 1000 دانه به ترتیب از ژنوتیپ‌های داراب 14 و مرکزی بدست آمد. ایشان بیشترین تعداد کپسول در هر بوته را از ژنوتیپ سیرجان با دور آبیاری 7 روز و کمترین تعداد کپسول در هر بوته را از ژنوتیپ‌های گرگان و بیرجند با دوره‌های آبیاری 7 روز گزارش کردند.

تعداد دانه در هر کپسول

بیشترین تعداد دانه در هر کپسول در شرایط آبیاری مطلوب و تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* به میزان 82/38 مشاهده شد (جدول 5) در این شرایط بین عدم مصرف قارچ میکوریزا با مصرف قارچ میکوریزای *G. intraradices* تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. کمترین تعداد دانه در هر کپسول از شرایط تنش خشکی شدید و عدم تلقیح قارچ میکوریزا به میزان 48 درصد مشاهده شد. تنش خشکی شدید در مقایسه با آبیاری مطلوب، تعداد دانه در هر کپسول را به میزان 46 درصد کاهش داد. در شرایط آبیاری مطلوب تلقیح با

شاخص برداشت

شاخص برداشت بیان کننده توزیع نسبی مواد فتوسنتزی بین مخزن‌های اقتصادی و سایر مخازن موجود در گیاه می‌باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد تاثیر رژیم آبیاری بر شاخص برداشت معنی-دار نیست (جدول 4). مهربابی و احسان زاده (1390) نیز در بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم‌های رطوبتی خاک نشان دادند تاثیر رژیم‌های رطوبتی خاک بر شاخص برداشت معنی‌دار نیست. سپاس و همکاران (1984) در تحقیقی روی سویا نشان دادند تنش خشکی در سویا تاثیری روی شاخص برداشت ندارد. این محققان بر این عقیده هستند که فرآیندهای رویشی و زایشی گیاه به یک اندازه تحت تاثیر تنش خشکی قرار می‌گیرند و به همین دلیل، شاخص برداشت در وضعیت‌های مختلف رطوبتی از ثبات زیادی برخوردار است و تغییرات کل ماده خشک گیاه و عملکرد دانه در مقایسه با شاخص برداشت در پاسخ به تنش خشکی بیشتر است. نتایج بدست آمده از این مطالعه در مورد شاخص برداشت با نتایج مهربابی و احسان زاده (1390) و سپاس و همکاران (1984) مطابقت داشت. بین مصرف قارچ و عدم مصرف قارچ میکوریزا از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. تاثیر ژنوتیپ بر میزان شاخص برداشت معنی‌دار بود (جدول 3). ژنوتیپ TS-3 با 41/02 درصد بیشترین و توده مغان با 22/35 درصد کمترین مقدار شاخص برداشت را نشان دادند (جدول 4). اختلاف بین ژنوتیپ‌ها در شاخص برداشت می‌تواند احتمالاً ناشی از اختلاف ژنتیکی بین آنها از نظر ظرفیت اختصاص تولیدات فتوسنتزی به بخش زایشی و دانه باشد (جدول 6).

تعداد دانه در واحد سطح

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی، تعداد دانه در واحد سطح کاهش

13، ناز چند شاخه، داراب 14 و دشتستان 5 با توده TS-3 اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول 6). دلیل افزایش عملکرد بیولوژیک در شرایط آبیاری مطلوب، گسترش بیشتر و دوام بهتر سطح برگ بوده که موجب ایجاد منبع فیزیولوژیکی کافی جهت استفاده هرچه بیشتر از نور دریافتی و تولید ماده خشک می‌شود. این نتایج با نتایج قلی نژاد و همکاران (1388) مطابقت داشت. گزارشات دیگری نیز وجود دارند که تنش خشکی عملکرد بیولوژیک را به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد. در این گزارشات دلیل کاهش عملکرد بیولوژیک، کاهش شاخص سطح برگ در تیمارهای تحت تنش خشکی بیان شده است که جذب نور در جامعه گیاهی را کاهش داده و به تبع آن ماده خشک تولیدی کاهش می‌یابد (مهربابی و احسان زاده 1390، اسکندری و همکاران 1389، آیین 1392). تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* و گونه *G. intraradices* نسبت به عدم تلقیح با قارچ میکوریزا، عملکرد بیولوژیک را به میزان 43 و 20 درصد بهبود بخشیده است (جدول 7). تاثیر قارچ میکوریزا بر افزایش رشد گیاه میزبان تحت شرایط تنش خشکی از طریق بهبود دسترسی فسفر می‌باشد زیرا دسترسی به فسفر در خاک‌های خشک کاهش می‌یابد (سابرامانیان و همکاران 2006). کاهش رطوبت خاک باعث کاهش سرعت انتشار مواد مغذی مخصوصاً فسفر از خاک به سطح جذبی ریشه شده لذا کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش جذب فسفر توسط ریشه گیاه هم در شرایط تنش خشکی و هم بدون تنش می‌شود (هتریک و همکاران 1996). بیشترین عملکرد بیولوژیک در توده محلی مغان و طارم زنجان در شرایط تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در ژنوتیپ TS-3 در شرایط عدم مصرف قارچ میکوریزا مشاهده شد (جدول 7). اسکندری و همکاران (1389) در تحقیقی روی ارقام Yellow witte، TN₂₃₈، TS₃، صفی آبادی و محلی رامهرمز کنجد، TS₃ را به عنوان رقم برتر معرفی کردند.

هر بوته، تعداد دانه در هر کپسول و وزن 1000 دانه ارتباط داد به عبارتی مصرف قارچ میکوریزا در مقایسه با حالت عدم مصرف قارچ میکوریزا، باعث افزایش اجزای عملکرد دانه شده و برآیند آنها افزایش عملکرد دانه می‌باشد. دلیل این امر ممکن است مرتبط با تاثیر میکوریزا بر جذب فسفر، ماندگاری بیشتر برگ‌ها روی گیاه، حفظ و افزایش اندازه برگ و نیز بهبود میزان فتوسنتز به واسطه کلروفیل بیشتر باشد (حبیب زاده و همکاران 2012، مارولاندا و همکاران 2003، خلوتی و همکاران 2005). راعی و همکاران (1394) نیز در بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه گلرنگ به چنین نتایجی دست یافتند. تاثیر میکوریزا در بهبود عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی شدید موثرتر از شرایط آبیاری مطلوب بوده است. نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد قارچ‌های میکوریزا در طی دوره تنش خشکی با افزایش پتانسیل آب برگ (لادجال و دوکر 2005)، افزایش سرعت مصرف دی اکسید کربن (آمرین و همکاران 2001) و افزایش میزان تعرق (باتهلن فالوای و همکاران 1998) و نیز افزایش میزان جذب آب در واحد زمان و در واحد طول ریشه گیاه میزبان (کوتاری و همکاران 1990) قادرند اثرات تنش خشکی در گیاه را کاهش دهند. شارما (2003) گزارش کرده است که تلقیح با قارچ میکوریزا باعث بالا رفتن کارایی جذب نیتروژن و فسفر، افزایش رشد و عملکرد دانه در گیاه می‌شود. در بین توده‌های مورد بررسی، بیشترین عملکرد دانه در توده‌های محلی مغان و محلی طارم زنجان در شرایط آبیاری مطلوب و کمترین میزان عملکرد دانه در توده‌های محلی جیرفت 13 و TS-3 مشاهده شد افزایش عملکرد دانه در توده‌های محلی فوق به دلیل افزایش اجزای عملکرد دانه مانند تعداد کپسول در هر بوته، تعداد دانه در هر کپسول و وزن 1000 دانه بوده است (جدول 6). آیین (1392) در تحقیقی روی کنجد، لاین JL-13 را به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی کرد که توانسته بود

معنی‌داری می‌یابد به طوری که تنش خشکی شدید و ملایم نسبت به شرایط آبیاری مطلوب، تعداد دانه در واحد سطح را به میزان 72 و 28 درصد کاهش داده است (جدول 4). تلقیح میکوریزا در مقایسه با عدم تلقیح (شاهد) تعداد دانه در واحد سطح را افزایش داد به طوری که تلقیح با قارچ میکوریزا گونه *G. mosseae* نسبت به عدم مصرف میکوریزا، تعداد دانه در واحد سطح را به میزان 44 درصد افزایش داد (جدول 4). در بین توده‌ها بیشترین و کمترین تعداد دانه در واحد سطح به ترتیب در توده‌های محلی مغان و TS-3 مشاهده شد (جدول 4).

عملکرد دانه

نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد دانه کاهش معنی‌داری می‌یابد به طوری که تنش خشکی شدید و ملایم نسبت به شرایط آبیاری مطلوب، عملکرد دانه را به میزان 63 و 31 درصد کاهش داده است (جدول 4). کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی می‌تواند به علت بسته شدن روزنه‌ها، افزایش آنزیم‌های تجزیه کننده پروتئین‌ها و کلروفیل باشد که باعث کاهش سرعت و میزان فتوسنتز، مقدار مواد فتوسنتزی و در نهایت عملکرد دانه می‌گردد (قلی نژاد و همکاران 1388 و 1389، باقری و همکاران 1379، فیاض و همکاران 1388). بیشتر بودن عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب می‌تواند به دلیل کاهش رقابت بین گیاهان، افزایش تعداد شاخه‌های فرعی و افزایش تعداد کپسول در بوته باشد. وجود همبستگی مثبت بین تعداد کپسول در هر بوته با عملکرد دانه نشان دهنده این نتیجه است (جدول 8). تلقیح با قارچ میکوریزا گونه‌های *G. mosseae* و *G. intraradices* نسبت به عدم مصرف قارچ میکوریزا، عملکرد دانه را به میزان 33 و 11 درصد بهبود بخشید. علت افزایش عملکرد دانه در اثر استفاده از قارچ را می‌توان به بهبود اجزای عملکرد دانه مانند تعداد کپسول در

تجزیه علیت بهتر می‌توان در این مورد تصمیم‌گیری کرد. زینلی و همکاران (1385) در بررسی روابط بین عملکرد دانه در بوته با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های کنجد نشان دادند که در کلیه ژنوتیپ‌ها، عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی‌داری با تعداد کپسول در هر بوته، ارتفاع بوته، تعداد گره ساقه اصلی و وزن دانه در کپسول دارد. اسکندری و همکاران (1389) نیز بیان داشتند که بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد که در تطابق با نتایج این تحقیق است. در این آزمایش تنش خشکی با تغییر اجزای عملکرد دانه، عملکرد را کاهش داد. کاربرد قارچ میکوریزا مخصوصاً در شرایط تنش خشکی باعث جبران کاهش عملکرد دانه گردید.

هم در شرایط تنش خشکی و هم در شرایط بدون تنش خشکی عملکرد دانه بیشتری تولید کند.

همبستگی بین صفات مورد مطالعه

جدول 8 نشان می‌دهد که بین صفات تعداد کپسول در هر بوته، وزن 1000 دانه، تعداد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در هر کپسول و عملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه همبستگی مثبت معنی‌داری وجود دارد. بنابراین با افزایش اجزای عملکرد دانه کنجد به خصوص تعداد کپسول در هر بوته و تعداد دانه در واحد سطح می‌توان عملکرد دانه را بهبود بخشید. البته همبستگی به تنهایی نمی‌تواند روابط بین دو متغیر را توجیه نماید به خاطر اینکه ممکن است این دو متغیر تحت تاثیر متغیرهای دیگر قرار گرفته باشند. با انجام

جدول 3- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کنجد

میانگین مربعات							
منابع تغییر	درجه آزادی	تعداد کپسول در هر بوته	وزن در هر کپسول	تعداد دانه	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیک	شاخص برداشت در واحد سطح
بلوک	2	8/24 ^{ns}	0/008*	1/63**	2734/14 ^{ns}	167556/78*	294/71 ^{ns}
آبیاری	2	265/04**	0/14**	66/78**	266686/23**	1908992/48**	563/42 ^{ns}
میکوریزا	2	87/97**	0/011**	3/32**	48109/57**	1316265/33**	868/51 ^{ns}
آبیاری × میکوریزا	4	2/61 ^{ns}	0/001 ^{ns}	0/25*	1553/77 ^{ns}	90166/85 ^{ns}	87/26 ^{ns}
خطای اصلی (E _{ab})	16	4/09	0/0017	0/089	6786/56	33869/81	531/35
ژنوتیپ	7	70/35**	0/017**	3/44**	47839/36**	1465993/13**	947/45**
آبیاری × ژنوتیپ	14	0/41 ^{ns}	0/00083**	0/193**	4773/73**	35806/38**	82/97**
میکوریزا × ژنوتیپ	14	0/67 ^{ns}	0/00022 ^{ns}	0/038 ^{ns}	130/59 ^{ns}	34119/25**	29/15 ^{ns}
آبیاری × میکوریزا × ژنوتیپ	28	0/26 ^{ns}	0/00037*	0/054 ^{ns}	119/75 ^{ns}	4646/09 ^{ns}	18/01 ^{ns}
خطای فرعی (E _c)	126	0/75	0/00022	0/058	754/43	4658/27	31/24
ضریب تغییرات (%)	-	10/12	5/74	2/94	20/67	14/33	18/01

**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1%، 5% و غیر معنی‌دار میباشد.

جدول 4- مقایسه میانگین اثرات ساده آبیاری، میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات مورد مطالعه

تیمار		تعداد دانه در شاخص	عملکرد دانه	تعداد کپسول
		واحد سطح برداشت	(گرم بر مترمربع)	در هر بوته
آبیاری				
110/083 a	193/43 a	33/05 a	112196 a	آبیاری مطلوب
85/320 b	133/41 b	32/21 a	81264 b	تنش ملایم خشکی
46/22 c	71/72 c	27/84 a	31569 c	تنش شدید خشکی
میکوریزا				
103/17 a	155/35 a	27/10 a	100070 a	<i>Glomus mosseae</i>
75/84 b	138/59 ab	33/68 a	68852 b	<i>Glomus intraradices</i>
62/62 b	104/62 b	32/31 a	56106 b	بدون میکوریزا
ژنوتیپ				
55/51 f	93/04 e	32/97 bc	48436 f	جیرفت 13
108/78 b	177/96 b	25/83 de	103997 b	محلی طارم زنجان
128/73 a	206/31 a	22/35 e	130414 a	محلی مغان
65/25 ef	105/26 de	33/05 bc	56462 ef	ناز چند شاخه
90/07 c	147/44 c	27/27 d	84697 c	TC-25
41/09 g	86/15 e	41/02 a	34044 g	TS-3
81/23 cd	128/29 cd	30/17 cd	75159 cd	داراب 14
73/67 de	118/33 d	35/59 b	66867 de	دشتستان 5

اعدادی که حروف مشابه دارند از نظر آماری اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1% بر اساس آزمون توکی ندارند.

جدول 5- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری و میکوریزا برای تعداد دانه در هر کپسول

تعداد دانه در هر کپسول	تیمار (آبیاری × میکوریزا)	مطابق آبیاری	مطابق تنش خشکی
82/38 a	<i>Glomus mosseae</i>	آبیاری	تنش خشکی
79/26 b	<i>Glomus intraradices</i>		
78/88 b	بدون میکوریزا		
79/35 b	<i>Glomus mosseae</i>	تنش خشکی	مطابق تنش خشکی
71/84 c	<i>Glomus intraradices</i>		
69/52 d	بدون میکوریزا		
54/63 e	<i>Glomus mosseae</i>	تنش خشکی	مطابق تنش خشکی
50/55 f	<i>Glomus intraradices</i>		
47/87 g	بدون میکوریزا		

اعدادی که حروف مشابه دارند از نظر آماری، اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1% بر اساس آزمون توکی ندارند.

جدول 6- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و ژنوتیپ برای صفات مورد مطالعه

تعداد دانه در هر کیپسول	عملکرد دانه (گرم بر مترمربع)	عملکرد بیولوژیک (گرم بر مترمربع)	شاخص برداشت	تیمار (آبیاری × ژنوتیپ)	
78/25 f	132/55 cdefg	430/17 fgghi	33/02 abcd	جیرفت 13	آبیاری مطلوبه ×
82/36 d	260/36 ab	904/09 b	30/17 abcd	محلی طارم زنجان	
86/36 a	317/94 a	1188/40 a	26/92 bcd	محلی مغان	
75/66 g	146/79 cdefg	459/73 fgh	32/94 abcd	ناز چند شاخه	
84/10 c	217/90 bc	689/89 cde	32/28 abcd	TC-25	
73/77 h	122/22 defghij	278/78 hijk	44/38 ab	TS-3	
80/25 e	181/56 bcde	624/82 def	30/72 abcd	داراب 14	
80/62 e	168/11 cdef	519/34 defg	33/95 abcd	دشتستان 5	
68/51 k	102/79 defghij	281/08 hijk	37/38 abc	جیرفت 13	تشدید ملاجه × خشکی
77/77 f	175/51 bcde	716/15 bcd	25/91 cd	محلی طارم زنجان	
85/10 b	187/57 bcd	882/26 bc	21/90 cd	محلی مغان	
69/62 j	112/81 defghij	330/62 ghijk	35/11 abcd	ناز چند شاخه	
75/36 g	140/86 cdefgh	601/86 def	23/86 cd	TC-25	
64/18 l	95/60 efghij	217/74 ijk	45/02 a	TS-3	
76/07 g	128/13 defghi	457/41 fgh	30/71 abcd	داراب 14	
71/95 i	123/94 defghij	353/22 ghij	37/77 abc	دشتستان 5	
43/96 r	43/77 ij	154/09 jk	28/51 abcd	جیرفت 13	تشدید ملاجه × خشکی
57/62 n	98/03 efghij	489/30 efgh	21/39 cd	محلی طارم زنجان	
61/77 m	113/42 defghij	632/75 def	18/24 d	محلی مغان	
45/51 q	56/17 hij	198/19 jk	31/11 abcd	ناز چند شاخه	
53/88 o	83/55 fghij	364/88 ghij	25/66 cd	TC-25	
42/48 s	40/65 j	136/91 k	33/66 abcd	TS-3	
53/25 o	75/18 ghij	327/51 ghijk	29/07 abcd	داراب 14	
49/66 p	62/94 ghij	186/89 jk	35/06 abcd	دشتستان 5	

اعدادی که حروف مشابه دارند از نظر آماری، اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% بر اساس آزمون توکی ندارند.

جدول 7- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری میکوریزا و ژنوتیپ برای عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه

وزن هزار دانه (گرم)		عملکرد بیولوژیک (گرم بر مترمربع)		تیمار (ژنوتیپ)	میکوریزا
آبیاری مطلوب	تنش ملایم	تنش شدید			
2/8 defghi	2/5 ghijkl	2/1 klmnop	374/59 fghij	جیرفت 13	<i>Glomus mosseae</i>
3/7 ab	2/8 defghi	2/4 hijklm	923/81 ab	محلی طارم زنجان	
3/8 a	3/1 cdef	2/7 efghij	1127/93 a	محلی مغان	
2/9 cdefgh	2/6 fghijk	2/1 klmnop	416/49 fgh	ناز چند شاخه	
3/7 ab	2/8 defghi	2/4 hijklm	745/99 bc	TC-25	
2/6 fghijk	2/4 hijklm	2/0 lmnop	264/19 ghij	TS-3	
3/3 abcd	2/8 defghi	2/3 ijklmn	657/46 cde	داراب 14	
3/1 cdef	2/7 efghij	2/2 jklmno	477/65 efg	دشتستان 5	
2/6 fghijk	2/5 ghijkl	1/9 mnop	277/63 ghij	جیرفت 13	<i>Glomus intraradices</i>
3/3 abcd	2/7 efghij	2/4 hijklm	663/26 cde	محلی طارم زنجان	
3/4 abc	2/9 cdefgh	2/6 fghijk	855/04 bc	محلی مغان	
2/7 efghij	2/6 fghijk	2/1 klmnop	336/17 fghij	ناز چند شاخه	
3/2 bcde	2/7 efghij	2/2 jklmno	504/76 ef	TC-25	
2/5 ghijkl	2/4 hijklm	1/9 mnop	202/20 ij	TS-3	
3/0 cdefg	2/7 efghij	2/1 klmnop	407/43 fghi	داراب 14	
2/9 cdefgh	2/6 fghijk	2/1 klmnop	328/50 fghij	دشتستان 5	
2/9 cdefgh	2/3 ijklmn	1/7 op	213/12 hij	جیرفت 13	بدون میکوریزا
3/0 cdefg	2/6 fghijk	2/3 ijklmn	522/47 def	محلی طارم زنجان	
3/3 abcd	2/8 defghi	2/6 fghijk	720/42 bcd	محلی مغان	
2/6 fghijk	2/4 hijklm	1/8 nop	235/89 hij	ناز چند شاخه	
3/3 abcd	2/5 ghijkl	2/1 klmnop	405/88 fghi	TC-25	
2/8 defghi	2/2 jklmno	1/6 p	167/03 j	TS-3	
3/0 cdefg	2/4 hijklmn	2/0 lmnop	344/85 fghij	داراب 14	
3/0 cdefg	2/4 hijklmn	1/9 mnop	253/29 hij	دشتستان 5	

در هر ستون تفاوت بین دو میانگین که یک حرف مشترک دارند بر اساس آزمون توکی از لحاظ آماری در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار نیست.

جدول 8- ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه

7	6	5	4	3	2	1	
						1	1- تعداد کپسول در هر بوته
					1	0/90**	2- وزن 1000 دانه
				1	0/90**	0/84**	3- تعداد دانه در هر کپسول
			1	0/84**	0/93**	0/93**	4- عملکرد دانه
		1	0/90**	0/72**	0/83**	0/95**	5- عملکرد بیولوژیک
	1	-0/55**	-0/22 ^{ns}	-0/07 ^{ns}	-0/17 ^{ns}	-0/41**	6- شاخص برداشت
1	-0/36**	0/94*	0/94*	0/86**	0/91**	0/99**	7- تعداد دانه در واحد سطح

**, *، و Ns به ترتیب اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1%، 5% و غیر معنی‌دار می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی

میکوریزا مخصوصاً گونه *G. mosseae* عملکرد و اجزای عملکرد دانه را بهبود بخشید. توده‌های محلی نسبت به تنش خشکی عکس‌العمل‌های متفاوتی داشتند. توده‌های محلی مغان و طارم زنجان بر سایر ژنوتیپ‌ها برتری داشته و می‌توان آنها را به عنوان ژنوتیپ‌های مناسب برای کاشت معرفی کرد. به عبارتی این توده‌ها وابستگی و همزیستی بهتری با قارچ‌های میکوریزا نشان دادند و همزیستی بهتر باعث شد قارچ‌های میکوریزا در این توده‌ها در مقایسه با سایرین، اجزای عملکرد دانه را بیشتر افزایش داده و عملکرد دانه و وزن خشک بیشتری تولید کنند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تنش خشکی و کمبود آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانه توده‌های محلی کنجد را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. کاربرد قارچ میکوریزا در هر سه شرایط مختلف آبیاری عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلیه توده‌های محلی را افزایش داد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از قارچ میکوریزا نه تنها در شرایط تنش خشکی باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه می‌شود و اثرات کمبود آب را کاهش می‌دهد بلکه در شرایط مطلوب آبیاری نیز می‌توان با مصرف قارچ

منابع مورد استفاده

- آیین ا. 1392. اثر حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو ژنوتیپ کنجد. مجله به زراعی نهال و بذر، 29 (1): 67-79.
- اسکندری ح، زهتاب سلماسی ز و قاسمی گل‌عذانی ک. 1389. ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد دانه ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به عنوان کشت دوم. مجله دانش کشاورزی پایدار، 20 (1): 39-51.
- باقری ع ر، نظامی ا. و سلطانی م. 1379. اصلاح حبوبات سرمدوست برای تحمل به تنش‌ها. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 151-180.
- باقری و، شمشیری م ح، شیرانی ح و روستا ح ر. 1390. اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‌های دو رقم پایه‌ای پسته اهلی. مجله علوم باغبانی ایران. 365-377.
- جمشیدی ا، قلاوند ا، زارع م ج و جمشیدی ف ع ر. 1388. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی صالحی آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (*Helianthus annuus* L.). مجله علوم زراعی ایران، 11 (2): 136-150.
- حقیقت نیا ح، نادیان ح، رجالی ف و توکلی ا ر. 1391. اثر دو گونه قارچ میکوریز-آربسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر پایه مکزیکن لایم تحت شرایط تنش خشکی (*Citrus aurantifolia*). مجله به زراعی نهال و بذر، 2 (28): 403-417.
- راعی ی، شریعتی ج. و ویسانی و. 1394. تاثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 25 (1): 65-84.
- رجالی ف، علیزاده ع، ملکوتی م ج و صالح راستین ن. 1386. بررسی تأثیر رابطه همزیستی میکوریزا آربوسکولار در رشد، عملکرد و جذب عناصر معدنی در گیاه گندم تحت تنش خشکی. مجله علوم خاک و آب، 21 (2): 241-259.

- رحیمی ل، اردکانی م ر، پاک نژاد ف و رجالی ف. 1388. بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت به خشکی دو رقم سورگوم دانه‌ای. مجله زراعت و اصلاح نباتات، 5 (1): 43-57.
- زینلی ح، میرلوحی آ. ف. و صفایی ل. 1385. ارزیابی روابط بین عملکرد دانه در بوته با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های کنجد. پژوهش در علوم کشاورزی، 2 (1): 1-9.
- علی آبادی فراهانی، ع، ارباب، ع. و عباس زاده، ب. 1387. تاثیر سوپر فسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک *Glomus hoi* بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی *Coriandrum sativum* L. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 24 (1): 18-30.
- فیاض ف. و طالبی ر. 1388. تعیین روابط میان عملکرد و برخی از اجزای عملکرد نخود زراعی با استفاده از تجزیه علیت. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 7 (1): 135-141.
- قلی نژاد ا، آینه بند ا، حسن زاده قورت تپه ع، برنوسی ا. و رضایی ح. 1388. بررسی تاثیر تنش خشکی با سطوح نیتروژن و تراکم بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی، 16 (3): 1-28.
- قلی نژاد ا، آینه بند ا، حسن زاده قورت تپه ع، نورمحمدی ق. و برنوسی ا. 1389. تاثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه. مجله علمی پژوهشی دانش آب و خاک، 20 (1): 27-45.
- مهرابی ز. و احسان زاده پ. 1390. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجد تحت رژیم‌های رطوبتی خاک. مجله به زراعی کشاورزی، 13 (2): 75-88.
- نادیان، ح. 1390. اثر تنش خشکی و هم زیستی میکوریزا بر رشد و جذب فسفر توسط دو رقم سورگوم متفاوت در ریخت شناسی ریشه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 15 (57): 127-140.
- Al-Palsan M, Boydak E, Hayta M, Gercek S and Simsek M, 2001. Effect of row space and irrigation on seed composition of Turkish Sesame. Journal of Crop Science, 78: 933-935.
- Amani M, Golkar P, Mohammadi-Nejad G, 2012. Evaluation of drought tolerance in different genotypes of Sesame. International Journal of Recent Scientific Research, 3(4): 226-230.
- Amerian MR, Stewart WS and Griffiths H, 2001. Effect of two species of arbuscular mycorrhizal fungi on growth, assimilation and leaf water relations in maize (*Zea mays*). Aspects of Applied Biology, 63: 71-76.
- Bahrami H, Razmjoo J and Ostadi Jafari A, 2012. Effect of drought stress on germination and seedling growth of sesame cultivars (*Sesamum indicum* L.). International Journal of Agriculture Science, 2(5): 423-428.
- Bathlenfalvay GJ, Brown MS, Ames RN and Thomas RS, 1998. Effect of drought on host and endophyte development in mycorrhizal soybean in relation to water use and phosphate uptake. Physiologia Plantarum, 72: 565-571.
- Bor M, Seckin B, Ozgur R, Yılmaz O, Ozdemir F and Turkan I, 2009. Comparative effects of drought, salt, heavy metal and heat stresses on gamma-aminobutyric acid levels of sesame (*Sesamum indicum* L.). Acta Physiologia Plantarum, 31(3): 655-659.

- Boureima S, Diouf M, Diop TA, Diatta M, Leye EM, Ndiaye F and Seck D, 2007. Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation on the growth and the development of sesame (*Sesamum indicum* L.). African Journal of Agricultural Research, 3 (3): 234-238.
- Cho K, Toler H, Lee J, Ownely B, Stutz JC, Moore JL and Auge RM, 2006. Mycorrhizal symbiosis and response of sorghum plants to combined drought and salinity stresses. Journal of Plant Physiology, 163:517528.
- FAO. 2012. Yearbook production. FAO Pub. Rome, Italy.
- Habibzadeh Y, Pirzad A, Zardashtai MR, Jalilian J and Eini O, 2012. Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on seed and protein yield under water-deficit stress in Mung Bean. Agronomy Journal, 105 (1): 79-84.
- Hassanzadeh M, Asghari A, Jamaati-e-Somarin SH, Saeidi M, Zabihi-e-Mahmoodabad R and Hokmalipour S, 2009. Effects of water deficit on drought tolerance indices of sesame (*Sesamum indicum* L.) genotypes in Moghan Region. Research Journal of Environmental Sciences, 3: 116-121.
- Heidari M, Galavi M, Hassani M, 2011. Effect of sulfur and iron fertilizers on yield, yield components and nutrient uptake in sesame (*Sesamum indicum* L.) under water stress. African Journal of Biotechnology, 10(44): 816-8822.
- Hetrick BAD, Wilson GWT and Todd TC, 1996. Mycorrhizal response in wheat cultivars: Relationship to phosphorus. Canadian Journal of Botany, 74: 19-25.
- Kapoor R, Giri B and Mukerji G, 2001. Mycorrhization of coriander (*Coriandrum sativum* L) to enhance the concentration and quality of essential oil. Journal of the Science of Foot and Agriculture, 82(4): 339-342.
- Khalvati MA, Hu Y, Mozafar A and Schmidhalter U, 2005. Quantification of water uptake by Arbuscular Mycorrhizal hyphae and its significance for leaf growth, water relations and gas exchange of barely subjected to drought stress. Plant Biology, 7: 706-712.
- Kothari SK, Marschner H. and George E. 1990. Effect of VA mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms on root and shoot morphology, growth, and water relations of maize. New Phytologist, 116: 303-311.
- Ladjal M, Huc R and Ducrey M, 2005. Drought effects on hydraulic conductivity and xylem vulnerability to embolism in diverse species and provenances of Mediterranean cedars. Tree Physiology, 25: 1109 – 1117.
- Marulanda A, Azcon R and Luizi-Lozano JM, 2003. Contribution of six Arbuscular Mycorrhizal Fungal isolates to water uptake by *Lactuca sativa* plants drought stress. Physiology Plant, 119: 526-533.
- Mensah JK, Obadoni BO, Eruotor P and Onome-Trieguna F, 2006. Simulated flooding and drought effects on germination, growth and yield parameters of sesame. African Journal Biotechnology, 13: 1249-1253.
- Orruno E and Morgan MRA, 2007. Purification and characterization of the 7S globulin storage protein from sesame (*Sesamum indicum* L.). Food Chemistry, 100: 926-934.
- Passioura JB, 2007. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. Journal of Experimental Botany, 58(2): 113-117.
- Saeidi A, Tohidi-Nezhad E, Ebrahimi F, Mohammadi-Nejad G and Shirzadi MH, 2012. Investigation of water stress on yield and some yield components of sesame genotypes in Jiroft region. Journal of Applied Sciences Research, 8 (1): 243-246.
- Sainz MJ, Taboada-Castro MT and Vilarino A, 1998. Growth, mineral and mycorrhizal colonization of red clover and cucumber plants grown in a soil amended with composted urban wastes. Plant and Soil, 205: 85-92.
- Sepaskhah AR and Andam M, 2001. Crop coefficient of sesame in a semi-arid region of I.R. Iran. Agriculture Water Management, 49: 51-63.

- Sharma AK, 2003. Biofertilizers for sustainable agriculture. *Agronomy Bioscience India*, 70-79.
- Soleimanzadeh H, 2010. Effect of VA-Mycorrhiza on Growth and Yield of Sunflower (*Helianthus annuus* L.) at Different Phosphorus Levels. *World Academy of Science, Engineering Technology*, 71: 414-417.
- Spaeth SC, Randall HC, Sinclair DR and Vendeland JS, 1984. Stability of soybean harvest index. *Agronomy*, 76:462-486.
- Subramanian KS, Santhanakrishnan P and Balasubramanian P, 2006. Responses of field grown tomato plants Arbuscular Mycorrhizal Fungal Arbuscular Mycorrhizal Fung colonization under varying intensities of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 107: 245-253.
- Tohidi-Moghaddam H, Sani B, Ghooshchi F, 2004. The effect of nitrogen fixing and phosphate solubilizing microorganism on some quantitative parameters on soybean from sustainable agricultural point of views. *Proceeding of 8th Agronomy and Plant Breeding Congress of Iran*, Guilan University, Iran.
- Turk MA, Rahmsn A, Tawaha M and Lee KD, 2004. Seed germination and seedling growth of three lentil cultivars under moisture stress. *Asian Journal Plant Sciences*, 3: 394-397.
- Weiss EA, 2000. *Oilseed crops*. 2nd ed. Oxford, Blackwell Science. Oxford, U.K.